

表 660 降圧薬使用の有無 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	81,085	161,762	242,847	1,391	65,900	310,138
(%)	(33.4)	(66.6)	(100.0)			
PD単独	937	3,608	4,545	51	2,335	6,931
(%)	(20.6)	(79.4)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテあり	40	101	141		36	177
(%)	(28.4)	(71.6)	(100.0)			
PD.HD併用週1HD(F)	209	869	1,078	5	413	1,496
(%)	(19.4)	(80.6)	(100.0)			
PD.HD併用週2HD(F)	33	98	131		34	165
(%)	(25.2)	(74.8)	(100.0)			
PD.HD併用週3HD(F)	7	24	31	1	5	37
(%)	(22.6)	(77.4)	(100.0)			
PD.HD併用週4HD(F)	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
PD.HD併用その他	7	35	42		21	63
(%)	(16.7)	(83.3)	(100.0)			
合計	82,319	166,497	248,816	1,448	68,744	319,008
(%)	(33.1)	(66.9)	(100.0)			
不明	7	9	16	2	4	22
(%)	(43.8)	(56.3)	(100.0)			
記載なし					79	79
(%)						
総計	82,326	166,506	248,832	1,450	68,827	319,109
(%)	(33.1)	(66.9)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0712##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査