

表 662 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	28 (41.8)	39 (58.2)	67 (100.0)		26	93
15歳～ (%)	217 (31.8)	466 (68.2)	683 (100.0)	2	226	911
30歳～ (%)	3,379 (32.2)	7,100 (67.8)	10,479 (100.0)	48	2,895	13,422
45歳～ (%)	13,798 (30.8)	30,955 (69.2)	44,753 (100.0)	234	12,357	57,344
60歳～ (%)	34,587 (31.2)	76,112 (68.8)	110,699 (100.0)	658	30,272	141,629
75歳～ (%)	28,163 (36.4)	49,291 (63.6)	77,454 (100.0)	467	21,692	99,613
90歳～ (%)	2,154 (45.9)	2,543 (54.1)	4,697 (100.0)	41	1,357	6,095
合計 (%)	82,326 (33.1)	166,506 (66.9)	248,832 (100.0)	1,450	68,825	319,107
不明 (%)						
記載なし (%)					2	2
総計 (%)	82,326 (33.1)	166,506 (66.9)	248,832 (100.0)	1,450	68,827	319,109
平均	69.01	67.68	68.12	69.16	68.23	68.15
標準偏差	12.77	12.29	12.47	12.15	12.55	12.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0714##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査