

表 664 降圧薬使用の有無 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	27,017 (37.7)	44,684 (62.3)	71,701 (100.0)	379	19,703	91,783
慢性腎孟腎炎 (%)	981 (42.4)	1,333 (57.6)	2,314 (100.0)	9	573	2,896
急速進行性糸球体腎炎 (%)	806 (40.5)	1,186 (59.5)	1,992 (100.0)	11	535	2,538
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	483 (41.1)	692 (58.9)	1,175 (100.0)	11	297	1,483
その他の分類不能の腎炎 (%)	440 (39.1)	686 (60.9)	1,126 (100.0)	7	321	1,454
多発性囊胞腎 (%)	3,393 (37.3)	5,695 (62.7)	9,088 (100.0)	46	2,337	11,471
腎硬化症 (%)	8,169 (32.5)	16,939 (67.5)	25,108 (100.0)	128	6,414	31,650
悪性高血圧 (%)	600 (27.5)	1,581 (72.5)	2,181 (100.0)	18	522	2,721
糖尿病性腎症 (%)	25,838 (26.7)	70,997 (73.3)	96,835 (100.0)	586	26,236	123,657
SLE腎炎 (%)	701 (39.6)	1,067 (60.4)	1,768 (100.0)	8	446	2,222
アミロイド腎 (%)	155 (46.4)	179 (53.6)	334 (100.0)	4	100	438
痛風腎 (%)	359 (41.7)	502 (58.3)	861 (100.0)	2	193	1,056
先天性代謝異常による腎不全 (%)	103 (45.2)	125 (54.8)	228 (100.0)	1	52	281
腎・尿路結核 (%)	54 (41.9)	75 (58.1)	129 (100.0)	1	38	168
腎・尿路結石 (%)	197 (42.2)	270 (57.8)	467 (100.0)	2	109	578
腎・尿路腫瘍 (%)	278 (36.4)	485 (63.6)	763 (100.0)	3	193	959
閉塞性尿路障害 (%)	259 (44.0)	330 (56.0)	589 (100.0)	3	151	743
骨髓腫 (%)	139 (56.7)	106 (43.3)	245 (100.0)	4	74	323
腎形成不全 (%)	254 (48.0)	275 (52.0)	529 (100.0)	2	133	664
不明 (%)	8,868 (38.0)	14,496 (62.0)	23,364 (100.0)	159	7,889	31,412
再導入 (%)	679 (39.8)	1,025 (60.2)	1,704 (100.0)	4	466	2,174
その他 (%)	2,553 (40.3)	3,778 (59.7)	6,331 (100.0)	62	2,045	8,438
合計 (%)	82,326 (33.1)	166,506 (66.9)	248,832 (100.0)	1,450	68,827	319,109
記載なし (%)						
総計 (%)	82,326 (33.1)	166,506 (66.9)	248,832 (100.0)	1,450	68,827	319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D0716##