

表 667 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (25.0)	3 (75.0)	4 (100.0)		1	5
15歳～ (%)	126 (31.0)	280 (69.0)	406 (100.0)		90	496
30歳～ (%)	2,157 (32.7)	4,430 (67.3)	6,587 (100.0)	18	1,209	7,814
45歳～ (%)	8,782 (30.5)	20,054 (69.5)	28,836 (100.0)	155	5,501	34,492
60歳～ (%)	23,854 (30.7)	53,838 (69.3)	77,692 (100.0)	478	14,212	92,382
75歳～ (%)	21,454 (36.6)	37,240 (63.4)	58,694 (100.0)	383	10,947	70,024
90歳～ (%)	1,648 (45.4)	1,982 (54.6)	3,630 (100.0)	30	661	4,321
合計 (%)	58,022 (33.0)	117,827 (67.0)	175,849 (100.0)	1,064	32,621	209,534
不明 (%)						
記載なし (%)					2	2
総計 (%)	58,022 (33.0)	117,827 (67.0)	175,849 (100.0)	1,064	32,623	209,536
平均	69.89	68.44	68.92	70.52	68.91	68.93
標準偏差	12.58	12.07	12.26	11.36	12.30	12.26

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0721##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査