

表 668 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	12,242 (30.0)	28,563 (70.0)	40,805 (100.0)	293	7,153	48,251
2年～ (%)	13,793 (30.9)	30,793 (69.1)	44,586 (100.0)	224	8,552	53,362
5年～ (%)	14,006 (31.7)	30,161 (68.3)	44,167 (100.0)	246	8,311	52,724
10年～ (%)	7,659 (34.1)	14,832 (65.9)	22,491 (100.0)	149	4,067	26,707
15年～ (%)	4,498 (38.5)	7,191 (61.5)	11,689 (100.0)	64	2,195	13,948
20年～ (%)	2,631 (42.8)	3,519 (57.2)	6,150 (100.0)	43	1,158	7,351
25年～ (%)	1,503 (48.5)	1,599 (51.5)	3,102 (100.0)	21	600	3,723
30年～ (%)	930 (56.1)	729 (43.9)	1,659 (100.0)	13	297	1,969
35年～ (%)	526 (62.0)	323 (38.0)	849 (100.0)	2	145	996
40年～ (%)	209 (71.1)	85 (28.9)	294 (100.0)	4	55	353
合計 (%)	57,997 (33.0)	117,795 (67.0)	175,792 (100.0)	1,059	32,533	209,384
不明 (%)	25 (43.9)	32 (56.1)	57 (100.0)	5	90	152
記載なし (%)						
総計 (%)	58,022 (33.0)	117,827 (67.0)	175,849 (100.0)	1,064	32,623	209,536
平均	7.96	6.43	6.93	7.05	6.98	6.94
標準偏差	8.11	6.55	7.14	7.53	7.12	7.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0722##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査