

表 669 降圧薬使用の有無 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

原疾患	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	18,037 (37.5)	30,012 (62.5)	48,049 (100.0)	254	8,869	57,172
慢性腎孟腎炎 (%)	663 (42.1)	910 (57.9)	1,573 (100.0)	6	289	1,868
急速進行性糸球体腎炎 (%)	587 (40.7)	854 (59.3)	1,441 (100.0)	9	237	1,687
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	286 (40.4)	422 (59.6)	708 (100.0)	9	132	849
その他の分類不能の腎炎 (%)	298 (40.3)	441 (59.7)	739 (100.0)	4	159	902
多発性囊胞腎 (%)	2,350 (37.2)	3,973 (62.8)	6,323 (100.0)	36	1,189	7,548
腎硬化症 (%)	6,079 (33.1)	12,263 (66.9)	18,342 (100.0)	98	3,078	21,518
悪性高血圧 (%)	444 (29.1)	1,083 (70.9)	1,527 (100.0)	10	240	1,777
糖尿病性腎症 (%)	19,140 (26.9)	52,101 (73.1)	71,241 (100.0)	455	12,772	84,468
SLE腎炎 (%)	482 (41.0)	693 (59.0)	1,175 (100.0)	4	191	1,370
アミロイド腎 (%)	109 (46.4)	126 (53.6)	235 (100.0)	3	42	280
痛風腎 (%)	254 (41.4)	360 (58.6)	614 (100.0)	1	85	700
先天性代謝異常による腎不全 (%)	71 (48.6)	75 (51.4)	146 (100.0)	1	22	169
腎・尿路結核 (%)	38 (44.2)	48 (55.8)	86 (100.0)	1	19	106
腎・尿路結石 (%)	144 (43.0)	191 (57.0)	335 (100.0)	2	47	384
腎・尿路腫瘍 (%)	203 (35.9)	363 (64.1)	566 (100.0)	3	75	644
閉塞性尿路障害 (%)	175 (42.8)	234 (57.2)	409 (100.0)	2	54	465
骨髓腫 (%)	103 (58.5)	73 (41.5)	176 (100.0)	4	33	213
腎形成不全 (%)	157 (48.9)	164 (51.1)	321 (100.0)	1	46	368
不明 (%)	6,261 (38.1)	10,181 (61.9)	16,442 (100.0)	112	3,924	20,478
再導入 (%)	391 (39.0)	611 (61.0)	1,002 (100.0)	3	159	1,164
その他 (%)	1,750 (39.8)	2,649 (60.2)	4,399 (100.0)	46	961	5,406
合計 (%)	58,022 (33.0)	117,827 (67.0)	175,849 (100.0)	1,064	32,623	209,536
記載なし (%)						
総計 (%)	58,022 (33.0)	117,827 (67.0)	175,849 (100.0)	1,064	32,623	209,536

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0723##