

表 670 降圧薬使用の有無 医療機関別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	120	265	385	3	44	432
(%)	(31.2)	(68.8)	(100.0)			
私立大学	412	653	1,065	20	472	1,557
(%)	(38.7)	(61.3)	(100.0)			
国立病院機構等	84	264	348		108	456
(%)	(24.1)	(75.9)	(100.0)			
県市町村立・国保	2,694	7,375	10,069	127	2,327	12,523
(%)	(26.8)	(73.2)	(100.0)			
JCHO(旧社会保険)等	720	1,665	2,385	4	58	2,447
(%)	(30.2)	(69.8)	(100.0)			
厚生連等	1,885	3,076	4,961	85	1,356	6,402
(%)	(38.0)	(62.0)	(100.0)			
その他公的	1,639	3,576	5,215	9	1,319	6,543
(%)	(31.4)	(68.6)	(100.0)			
私立総合	1,379	2,823	4,202	129	527	4,858
(%)	(32.8)	(67.2)	(100.0)			
私立	18,718	32,775	51,493	402	10,189	62,084
(%)	(36.4)	(63.6)	(100.0)			
私立診療所	30,371	65,355	95,726	285	16,223	112,234
(%)	(31.7)	(68.3)	(100.0)			
総計	58,022	117,827	175,849	1,064	32,623	209,536
(%)	(33.0)	(67.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0724##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査