

表 672 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)						
15歳～ (%)	62 (33.0)	126 (67.0)	188 (100.0)	1	45	234
30歳～ (%)	987 (32.0)	2,102 (68.0)	3,089 (100.0)	20	580	3,689
45歳～ (%)	4,152 (32.6)	8,567 (67.4)	12,719 (100.0)	55	2,260	15,034
60歳～ (%)	8,662 (32.9)	17,643 (67.1)	26,305 (100.0)	126	4,898	31,329
75歳～ (%)	5,187 (36.0)	9,214 (64.0)	14,401 (100.0)	55	2,773	17,229
90歳～ (%)	351 (48.5)	372 (51.5)	723 (100.0)	5	131	859
合計 (%)	19,401 (33.8)	38,024 (66.2)	57,425 (100.0)	262	10,687	68,374
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	19,401 (33.8)	38,024 (66.2)	57,425 (100.0)	262	10,687	68,374
平均	66.63	65.72	66.03	64.93	66.32	66.07
標準偏差	12.66	12.35	12.46	13.09	12.50	12.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0731##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査