

表 673 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 透析歴 | なし | あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------|--------|--------|
| 2年未満 (%) | 2,472 (29.1) | 6,014 (70.9) | 8,486 (100.0) | 46 | 1,486 | 10,018 |
| 2年～ (%) | 4,035 (30.3) | 9,293 (69.7) | 13,328 (100.0) | 64 | 2,546 | 15,938 |
| 5年～ (%) | 4,501 (30.5) | 10,254 (69.5) | 14,755 (100.0) | 54 | 2,773 | 17,582 |
| 10年～ (%) | 2,913 (34.2) | 5,617 (65.8) | 8,530 (100.0) | 24 | 1,562 | 10,116 |
| 15年～ (%) | 1,965 (38.3) | 3,166 (61.7) | 5,131 (100.0) | 24 | 903 | 6,058 |
| 20年～ (%) | 1,434 (44.3) | 1,801 (55.7) | 3,235 (100.0) | 17 | 605 | 3,857 |
| 25年～ (%) | 945 (48.7) | 996 (51.3) | 1,941 (100.0) | 9 | 395 | 2,345 |
| 30年～ (%) | 593 (52.6) | 534 (47.4) | 1,127 (100.0) | 14 | 226 | 1,367 |
| 35年～ (%) | 383 (59.8) | 258 (40.2) | 641 (100.0) | 8 | 131 | 780 |
| 40年～ (%) | 158 (65.3) | 84 (34.7) | 242 (100.0) | 2 | 43 | 287 |
| 合計 (%) | 19,399 (33.8) | 38,017 (66.2) | 57,416 (100.0) | 262 | 10,670 | 68,348 |
| 不明 (%) | 2 (22.2) | 7 (77.8) | 9 (100.0) | | 17 | 26 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 19,401 (33.8) | 38,024 (66.2) | 57,425 (100.0) | 262 | 10,687 | 68,374 |
| 平均 | 10.71 | 8.31 | 9.12 | 10.21 | 9.19 | 9.14 |
| 標準偏差 | 9.56 | 7.70 | 8.45 | 10.39 | 8.54 | 8.47 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0732##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査