

表 674 降圧薬使用の有無 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	7,278 (38.8)	11,501 (61.2)	18,779 (100.0)	89	3,520	22,388
慢性腎孟腎炎 (%)	238 (43.2)	313 (56.8)	551 (100.0)	2	74	627
急速進行性糸球体腎炎 (%)	155 (38.3)	250 (61.7)	405 (100.0)	1	78	484
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	155 (40.6)	227 (59.4)	382 (100.0)	2	75	459
その他の分類不能の腎炎 (%)	111 (37.5)	185 (62.5)	296 (100.0)	2	57	355
多発性囊胞腎 (%)	853 (38.8)	1,347 (61.2)	2,200 (100.0)	6	363	2,569
腎硬化症 (%)	1,617 (32.3)	3,392 (67.7)	5,009 (100.0)	20	867	5,896
悪性高血圧 (%)	123 (25.1)	367 (74.9)	490 (100.0)	3	62	555
糖尿病性腎症 (%)	5,431 (26.3)	15,193 (73.7)	20,624 (100.0)	100	3,792	24,516
SLE腎炎 (%)	174 (37.5)	290 (62.5)	464 (100.0)	3	70	537
アミロイド腎 (%)	38 (46.3)	44 (53.7)	82 (100.0)	1	15	98
痛風腎 (%)	81 (41.3)	115 (58.7)	196 (100.0)	1	30	227
先天性代謝異常による腎不全 (%)	22 (35.5)	40 (64.5)	62 (100.0)		11	73
腎・尿路結核 (%)	16 (42.1)	22 (57.9)	38 (100.0)		6	44
腎・尿路結石 (%)	36 (39.6)	55 (60.4)	91 (100.0)		22	113
腎・尿路腫瘍 (%)	65 (39.9)	98 (60.1)	163 (100.0)		27	190
閉塞性尿路障害 (%)	54 (43.9)	69 (56.1)	123 (100.0)		28	151
骨髓腫 (%)	16 (51.6)	15 (48.4)	31 (100.0)		6	37
腎形成不全 (%)	74 (50.7)	72 (49.3)	146 (100.0)	1	24	171
不明 (%)	2,054 (38.6)	3,273 (61.4)	5,327 (100.0)	21	1,183	6,531
再導入 (%)	232 (41.9)	322 (58.1)	554 (100.0)	1	78	633
その他 (%)	578 (40.9)	834 (59.1)	1,412 (100.0)	9	299	1,720
合計 (%)	19,401 (33.8)	38,024 (66.2)	57,425 (100.0)	262	10,687	68,374
記載なし (%)						
総計 (%)	19,401 (33.8)	38,024 (66.2)	57,425 (100.0)	262	10,687	68,374

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0733##