

表 675 降圧薬使用の有無 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	13	27	40		14	54
(%)	(32.5)	(67.5)	(100.0)			
私立大学	91	113	204		33	237
(%)	(44.6)	(55.4)	(100.0)			
国立病院機構等	13	39	52		3	55
(%)	(25.0)	(75.0)	(100.0)			
県市町村立・国保	590	1,359	1,949	12	597	2,558
(%)	(30.3)	(69.7)	(100.0)			
JCHO(旧社会保険)等	180	252	432		94	526
(%)	(41.7)	(58.3)	(100.0)			
厚生連等	333	663	996	4	471	1,471
(%)	(33.4)	(66.6)	(100.0)			
その他公的	340	535	875		207	1,082
(%)	(38.9)	(61.1)	(100.0)			
私立総合	385	730	1,115	9	341	1,465
(%)	(34.5)	(65.5)	(100.0)			
私立	5,433	9,877	15,310	205	2,490	18,005
(%)	(35.5)	(64.5)	(100.0)			
私立診療所	12,023	24,429	36,452	32	6,437	42,921
(%)	(33.0)	(67.0)	(100.0)			
総計	19,401	38,024	57,425	262	10,687	68,374
(%)	(33.8)	(66.2)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D0734##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査