

表 677 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	26 (41.9)	36 (58.1)	62 (100.0)		23	85
15歳～ (%)	16 (25.4)	47 (74.6)	63 (100.0)		31	94
30歳～ (%)	76 (19.3)	317 (80.7)	393 (100.0)	7	208	608
45歳～ (%)	279 (18.5)	1,233 (81.5)	1,512 (100.0)	13	758	2,283
60歳～ (%)	473 (18.9)	2,031 (81.1)	2,504 (100.0)	27	1,187	3,718
75歳～ (%)	278 (24.3)	865 (75.7)	1,143 (100.0)	7	551	1,701
90歳～ (%)	29 (38.7)	46 (61.3)	75 (100.0)	2	49	126
合計 (%)	1,177 (20.5)	4,575 (79.5)	5,752 (100.0)	56	2,807	8,615
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	1,177 (20.5)	4,575 (79.5)	5,752 (100.0)	56	2,807	8,615
平均	63.74	62.98	63.14	63.18	63.19	63.16
標準偏差	16.66	13.88	14.50	13.32	14.49	14.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0741##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査