

表 679 降圧薬使用の有無 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	383	1,444	1,827	17	822	2,666
(%)	(21.0)	(79.0)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	22	52	74	1	22	97
(%)	(29.7)	(70.3)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	9	31	40	1	20	61
(%)	(22.5)	(77.5)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	5	15	20		4	24
(%)	(25.0)	(75.0)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	13	41	54		21	75
(%)	(24.1)	(75.9)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	47	133	180	1	91	272
(%)	(26.1)	(73.9)	(100.0)			
腎硬化症	136	621	757	7	342	1,106
(%)	(18.0)	(82.0)	(100.0)			
悪性高血圧	12	58	70		36	106
(%)	(17.1)	(82.9)	(100.0)			
糖尿病性腎症	294	1,509	1,803	15	928	2,746
(%)	(16.3)	(83.7)	(100.0)			
SLE腎炎	8	25	33		22	55
(%)	(24.2)	(75.8)	(100.0)			
アミロイド腎	6	4	10		6	16
(%)	(60.0)	(40.0)	(100.0)			
痛風腎	7	9	16		7	23
(%)	(43.8)	(56.3)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	6	6	12		5	17
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
腎・尿路結核					1	1
(%)						
腎・尿路結石	5	11	16		5	21
(%)	(31.3)	(68.8)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	3	6	9		3	12
(%)	(33.3)	(66.7)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	4	9	13		7	20
(%)	(30.8)	(69.2)	(100.0)			
骨髄腫	1	4	5		2	7
(%)	(20.0)	(80.0)	(100.0)			
腎形成不全	17	27	44		21	65
(%)	(38.6)	(61.4)	(100.0)			
不明	133	425	558	12	319	889
(%)	(23.8)	(76.2)	(100.0)			
再導入	13	25	38		27	65
(%)	(34.2)	(65.8)	(100.0)			
その他	53	120	173	2	96	271
(%)	(30.6)	(69.4)	(100.0)			
合計	1,177	4,575	5,752	56	2,807	8,615
(%)	(20.5)	(79.5)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	1,177	4,575	5,752	56	2,807	8,615
(%)	(20.5)	(79.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0743##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査