

表 680 降圧薬使用の有無 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	59	254	313		243	556
(%)	(18.8)	(81.2)	(100.0)			
私立大学	84	589	673	23	453	1,149
(%)	(12.5)	(87.5)	(100.0)			
国立病院機構等	23	147	170		57	227
(%)	(13.5)	(86.5)	(100.0)			
県市町村立・国保	193	935	1,128	6	466	1,600
(%)	(17.1)	(82.9)	(100.0)			
JCHO(旧社会保険)等	33	131	164		332	496
(%)	(20.1)	(79.9)	(100.0)			
厚生連等	82	244	326	4	221	551
(%)	(25.2)	(74.8)	(100.0)			
その他公的	214	707	921	3	403	1,327
(%)	(23.2)	(76.8)	(100.0)			
私立総合	68	276	344	7	42	393
(%)	(19.8)	(80.2)	(100.0)			
私立	297	835	1,132	13	481	1,626
(%)	(26.2)	(73.8)	(100.0)			
私立診療所	124	457	581		109	690
(%)	(21.3)	(78.7)	(100.0)			
総計	1,177	4,575	5,752	56	2,807	8,615
(%)	(20.5)	(79.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0744##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査