

表 681 嘸煙の有無 治療方法別 (透析患者全体)

治療方法	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	143,253 (88.2)	19,130 (11.8)	162,383 (100.0)	11,456	59,865	233,704
血液透析濾過 (%)	45,964 (87.3)	6,705 (12.7)	52,669 (100.0)	3,744	18,386	74,799
血液濾過 (%)	8 (80.0)	2 (20.0)	10 (100.0)	4	5	19
血液吸着透析 (%)	962 (90.6)	100 (9.4)	1,062 (100.0)	50	243	1,355
在宅血液透析 (%)	374 (93.3)	27 (6.7)	401 (100.0)	83	133	617
腹膜透析 (%)	4,698 (90.0)	521 (10.0)	5,219 (100.0)	518	2,878	8,615
合計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109
記載なし (%)						
総計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D0810##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査