

表 683 嘸煙の有無 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	190,382 (88.0)	25,944 (12.0)	216,326 (100.0)	15,306	78,506	310,138
PD単独 (%)	3,688 (90.3)	398 (9.7)	4,086 (100.0)	434	2,411	6,931
HD(F)単独.PDカテあり (%)	108 (87.1)	16 (12.9)	124 (100.0)	11	42	177
PD.HD併用週1HD(F) (%)	895 (88.9)	112 (11.1)	1,007 (100.0)	78	411	1,496
PD.HD併用週2HD(F) (%)	109 (90.1)	12 (9.9)	121 (100.0)	10	34	165
PD.HD併用週3HD(F) (%)	26 (92.9)	2 (7.1)	28 (100.0)	3	6	37
PD.HD併用週4HD(F) (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
PD.HD併用その他 (%)	43 (97.7)	1 (2.3)	44 (100.0)	3	16	63
合計 (%)	195,252 (88.1)	26,485 (11.9)	221,737 (100.0)	15,845	81,426	319,008
不明 (%)	7 (100.0)		7 (100.0)	10	5	22
記載なし (%)					79	79
総計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0812##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査