

表 685 嘸煙の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	67 (100.0)		67 (100.0)	1	25	93
15歳～ (%)	563 (90.4)	60 (9.6)	623 (100.0)	36	252	911
30歳～ (%)	7,267 (78.4)	2,001 (21.6)	9,268 (100.0)	705	3,449	13,422
45歳～ (%)	31,603 (79.7)	8,067 (20.3)	39,670 (100.0)	3,040	14,634	57,344
60歳～ (%)	85,886 (87.2)	12,612 (12.8)	98,498 (100.0)	7,123	36,008	141,629
75歳～ (%)	65,715 (94.7)	3,667 (5.3)	69,382 (100.0)	4,644	25,587	99,613
90歳～ (%)	4,158 (98.2)	78 (1.8)	4,236 (100.0)	306	1,553	6,095
合計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,508	319,107
不明 (%)						
記載なし (%)					2	2
総計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109
平均	68.97	62.19	68.16	67.67	68.19	68.15
標準偏差	12.36	11.69	12.48	12.46	12.50	12.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0814##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査