

表 691 嘸煙の有無 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析歴	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
2年末満 (%)	31,839 (88.1)	4,312 (11.9)	36,151 (100.0)	2,669	9,431	48,251
2年～ (%)	35,137 (88.3)	4,672 (11.7)	39,809 (100.0)	2,586	10,967	53,362
5年～ (%)	34,452 (87.5)	4,910 (12.5)	39,362 (100.0)	2,694	10,668	52,724
10年～ (%)	17,735 (88.1)	2,395 (11.9)	20,130 (100.0)	1,386	5,191	26,707
15年～ (%)	9,307 (89.1)	1,138 (10.9)	10,445 (100.0)	751	2,752	13,948
20年～ (%)	4,916 (89.4)	583 (10.6)	5,499 (100.0)	378	1,474	7,351
25年～ (%)	2,511 (90.4)	266 (9.6)	2,777 (100.0)	206	740	3,723
30年～ (%)	1,330 (90.8)	135 (9.2)	1,465 (100.0)	119	385	1,969
35年～ (%)	690 (91.0)	68 (9.0)	758 (100.0)	61	177	996
40年～ (%)	259 (94.5)	15 (5.5)	274 (100.0)	22	57	353
合計 (%)	138,176 (88.2)	18,494 (11.8)	156,670 (100.0)	10,872	41,842	209,384
不明 (%)	50 (92.6)	4 (7.4)	54 (100.0)	13	85	152
記載なし (%)						
総計 (%)	138,226 (88.2)	18,498 (11.8)	156,724 (100.0)	10,885	41,927	209,536
平均	6.99	6.64	6.95	7.05	6.88	6.94
標準偏差	7.20	6.70	7.14	7.38	7.05	7.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0822##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査