

表 692 喫煙の有無 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	38,269 (89.9)	4,315 (10.1)	42,584 (100.0)	3,091	11,497	57,172
慢性腎孟腎炎 (%)	1,295 (90.9)	129 (9.1)	1,424 (100.0)	74	370	1,868
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,177 (90.3)	126 (9.7)	1,303 (100.0)	76	308	1,687
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	611 (94.9)	33 (5.1)	644 (100.0)	34	171	849
その他の分類不能の腎炎 (%)	587 (91.1)	57 (8.9)	644 (100.0)	44	214	902
多発性囊胞腎 (%)	5,164 (90.8)	523 (9.2)	5,687 (100.0)	384	1,477	7,548
腎硬化症 (%)	14,904 (90.3)	1,600 (9.7)	16,504 (100.0)	986	4,028	21,518
悪性高血圧 (%)	1,114 (83.3)	224 (16.7)	1,338 (100.0)	114	325	1,777
糖尿病性腎症 (%)	54,277 (85.7)	9,054 (14.3)	63,331 (100.0)	4,356	16,781	84,468
SLE腎炎 (%)	966 (91.5)	90 (8.5)	1,056 (100.0)	61	253	1,370
アミロイド腎 (%)	196 (94.2)	12 (5.8)	208 (100.0)	20	52	280
痛風腎 (%)	457 (83.5)	90 (16.5)	547 (100.0)	41	112	700
先天性代謝異常による腎不全 (%)	108 (86.4)	17 (13.6)	125 (100.0)	12	32	169
腎・尿路結核 (%)	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)	3	28	106
腎・尿路結石 (%)	272 (87.7)	38 (12.3)	310 (100.0)	17	57	384
腎・尿路腫瘍 (%)	465 (89.8)	53 (10.2)	518 (100.0)	26	100	644
閉塞性尿路障害 (%)	310 (87.3)	45 (12.7)	355 (100.0)	31	79	465
骨髄腫 (%)	156 (91.8)	14 (8.2)	170 (100.0)	9	34	213
腎形成不全 (%)	261 (90.9)	26 (9.1)	287 (100.0)	16	65	368
不明 (%)	13,289 (89.7)	1,530 (10.3)	14,819 (100.0)	1,107	4,552	20,478
再導入 (%)	789 (88.7)	101 (11.3)	890 (100.0)	66	208	1,164
その他 (%)	3,492 (89.4)	413 (10.6)	3,905 (100.0)	317	1,184	5,406
合計 (%)	138,226 (88.2)	18,498 (11.8)	156,724 (100.0)	10,885	41,927	209,536
記載なし (%)						
総計 (%)	138,226 (88.2)	18,498 (11.8)	156,724 (100.0)	10,885	41,927	209,536

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0823##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査