

表 697 喫煙の有無 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	14,937 (88.8)	1,888 (11.2)	16,825 (100.0)	1,111	4,452	22,388
慢性腎孟腎炎 (%)	432 (88.2)	58 (11.8)	490 (100.0)	26	111	627
急速進行性糸球体腎炎 (%)	335 (88.6)	43 (11.4)	378 (100.0)	28	78	484
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	342 (97.7)	8 (2.3)	350 (100.0)	22	87	459
その他の分類不能の腎炎 (%)	220 (86.3)	35 (13.7)	255 (100.0)	14	86	355
多発性囊胞腎 (%)	1,765 (90.7)	180 (9.3)	1,945 (100.0)	135	489	2,569
腎硬化症 (%)	4,063 (88.9)	506 (11.1)	4,569 (100.0)	315	1,012	5,896
悪性高血圧 (%)	354 (81.6)	80 (18.4)	434 (100.0)	26	95	555
糖尿病性腎症 (%)	15,605 (84.7)	2,829 (15.3)	18,434 (100.0)	1,365	4,717	24,516
SLE腎炎 (%)	370 (90.0)	41 (10.0)	411 (100.0)	35	91	537
アミロイド腎 (%)	70 (94.6)	4 (5.4)	74 (100.0)	4	20	98
痛風腎 (%)	147 (87.5)	21 (12.5)	168 (100.0)	12	47	227
先天性代謝異常による腎不全 (%)	52 (92.9)	4 (7.1)	56 (100.0)	4	13	73
腎・尿路結核 (%)	32 (97.0)	1 (3.0)	33 (100.0)	3	8	44
腎・尿路結石 (%)	70 (87.5)	10 (12.5)	80 (100.0)	9	24	113
腎・尿路腫瘍 (%)	130 (86.7)	20 (13.3)	150 (100.0)	10	30	190
閉塞性尿路障害 (%)	94 (81.7)	21 (18.3)	115 (100.0)	7	29	151
骨髓腫 (%)	26 (89.7)	3 (10.3)	29 (100.0)	2	6	37
腎形成不全 (%)	114 (87.0)	17 (13.0)	131 (100.0)	9	31	171
不明 (%)	4,214 (88.7)	537 (11.3)	4,751 (100.0)	371	1,409	6,531
再導入 (%)	416 (84.6)	76 (15.4)	492 (100.0)	42	99	633
その他 (%)	1,118 (85.7)	187 (14.3)	1,305 (100.0)	86	329	1,720
合計 (%)	44,906 (87.2)	6,569 (12.8)	51,475 (100.0)	3,636	13,263	68,374
記載なし (%)						
総計 (%)	44,906 (87.2)	6,569 (12.8)	51,475 (100.0)	3,636	13,263	68,374

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D0833##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査