

表 701 嘸煙の有無 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
2年末満 (%)	1,927 (88.6)	248 (11.4)	2,175 (100.0)	244	1,199	3,618
2年～ (%)	1,633 (90.1)	180 (9.9)	1,813 (100.0)	171	1,000	2,984
5年～ (%)	864 (92.8)	67 (7.2)	931 (100.0)	80	564	1,575
10年～ (%)	188 (90.0)	21 (10.0)	209 (100.0)	16	64	289
15年～ (%)	54 (93.1)	4 (6.9)	58 (100.0)	6	21	85
20年～ (%)	20 (95.2)	1 (4.8)	21 (100.0)		7	28
25年～ (%)	3 (100.0)		3 (100.0)	1	5	9
30年～ (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		1	6
35年～ (%)					1	1
40年～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	4,696 (90.0)	521 (10.0)	5,217 (100.0)	518	2,862	8,597
不明 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)		16	18
記載なし (%)						
総計 (%)	4,698 (90.0)	521 (10.0)	5,219 (100.0)	518	2,878	8,615
平均	3.17	2.57	3.11	2.74	2.93	3.03
標準偏差	3.70	3.13	3.65	3.37	3.28	3.52

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D0842##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査