

表 702 喫煙の有無 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,523	125	1,648	175	843	2,666
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	64	6	70	4	23	97
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	37	1	38	2	21	61
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	17		17	4	3	24
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	47	5	52	2	21	75
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	156	5	161	16	95	272
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
腎硬化症	627	49	676	68	362	1,106
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
悪性高血圧	47	13	60	9	37	106
(%)	(78.3)	(21.7)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,417	234	1,651	159	936	2,746
(%)	(85.8)	(14.2)	(100.0)			
SLE腎炎	30	2	32	2	21	55
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
アミロイド腎	9	1	10		6	16
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
痛風腎	14	1	15	1	7	23
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	11	1	12	1	4	17
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
腎・尿路結核					1	1
(%)						
腎・尿路結石	15	1	16	1	4	21
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	8	2	10		2	12
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	11	2	13		7	20
(%)	(84.6)	(15.4)	(100.0)			
骨髄腫	4		4	1	2	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	40	1	41	4	20	65
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
不明	444	53	497	52	340	889
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
再導入	28	5	33	4	28	65
(%)	(84.8)	(15.2)	(100.0)			
その他	149	14	163	13	95	271
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
合計	4,698	521	5,219	518	2,878	8,615
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	4,698	521	5,219	518	2,878	8,615
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0843##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査