

表 706 腹膜透析の経験 併用の状況別(透析患者全体)

併用の状況	なし	あり		合計	不明	記載なし	総計
		年末時点 カテーテル あり	年末時点 カテーテル なし				
HD(F)単独 (%)	218,948 (96.4)	1,096 (0.5)	7,167 (3.2)	227,211 (100.0)	999	81,928	310,138
PD単独 (%)		4,951 (99.5)	25 (0.5)	4,976 (100.0)		1,955	6,931
HD(F)単独.PDカテあり (%)	12 (7.5)	139 (87.4)	8 (5.0)	159 (100.0)	1	17	177
PD.HD併用週1HD(F) (%)		1,188 (98.8)	15 (1.2)	1,203 (100.0)		293	1,496
PD.HD併用週2HD(F) (%)		140 (97.9)	3 (2.1)	143 (100.0)		22	165
PD.HD併用週3HD(F) (%)		32 (97.0)	1 (3.0)	33 (100.0)		4	37
PD.HD併用週4HD(F) (%)		1 (100.0)		1 (100.0)			1
PD.HD併用その他 (%)		49 (94.2)	3 (5.8)	52 (100.0)		11	63
合計 (%)	218,960 (93.7)	7,596 (3.2)	7,222 (3.1)	233,778 (100.0)	1,000	84,230	319,008
不明 (%)	14 (87.5)	1 (6.3)	1 (6.3)	16 (100.0)	2	4	22
記載なし (%)						79	79
総計 (%)	218,974 (93.7)	7,597 (3.2)	7,223 (3.1)	233,794 (100.0)	1,002	84,313	319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0912##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査