

表 709 腹膜透析の経験 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	なし	あり		合計	不明	記載なし	総計
		年末時点で カテーテル あり	年末時点で カテーテル なし				
2年未満 (%)	48,320 (93.6)	2,795 (5.4)	483 (0.9)	51,598 (100.0)	207	18,733	70,538
2年～ (%)	54,716 (93.7)	2,498 (4.3)	1,170 (2.0)	58,384 (100.0)	253	21,531	80,168
5年～ (%)	54,334 (93.9)	1,522 (2.6)	2,038 (3.5)	57,894 (100.0)	262	20,989	79,145
10年～ (%)	28,149 (93.6)	441 (1.5)	1,478 (4.9)	30,068 (100.0)	118	10,370	40,556
15年～ (%)	15,285 (93.4)	162 (1.0)	914 (5.6)	16,361 (100.0)	70	5,663	22,094
20年～ (%)	8,592 (92.5)	88 (0.9)	607 (6.5)	9,287 (100.0)	37	3,160	12,484
25年～ (%)	4,724 (93.0)	46 (0.9)	310 (6.1)	5,080 (100.0)	24	1,793	6,897
30年～ (%)	2,710 (95.0)	19 (0.7)	125 (4.4)	2,854 (100.0)	15	1,118	3,987
35年～ (%)	1,547 (95.6)	12 (0.7)	59 (3.6)	1,618 (100.0)	7	527	2,152
40年～ (%)	528 (91.5)	11 (1.9)	38 (6.6)	577 (100.0)	9	207	793
合計 (%)	218,905 (93.7)	7,594 (3.2)	7,222 (3.1)	233,721 (100.0)	1,002	84,091	318,814
不明 (%)	69 (94.5)	3 (4.1)	1 (1.4)	73 (100.0)		222	295
記載なし (%)							
総計 (%)	218,974 (93.7)	7,597 (3.2)	7,223 (3.1)	233,794 (100.0)	1,002	84,313	319,109
平均	7.37	4.06	11.14	7.38	7.74	7.25	7.35
標準偏差	7.61	5.13	8.15	7.61	8.27	7.57	7.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0915##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査