

表 710 腹膜透析の経験 原疾患別(透析患者全体)

原疾患	なし	あり		合計	不明	記載なし	総計
		年末時点 カテーテル あり	年末時点 カテーテル なし				
慢性糸球体腎炎	61,859 (%)	2,466 (3.6)	3,322 (4.9)	67,647 (100.0)	291	23,845	91,783
慢性腎孟腎炎	1,969 (%)	94 (4.3)	128 (5.8)	2,191 (100.0)	9	696	2,896
急速進行性糸球体腎炎	1,780 (%)	56 (3.0)	45 (2.4)	1,881 (100.0)	3	654	2,538
妊娠腎/妊娠中毒症	1,001 (%)	28 (2.6)	60 (5.5)	1,089 (100.0)	3	391	1,483
その他の分類不能の腎炎	939 (%)	69 (6.6)	44 (4.2)	1,052 (100.0)	7	395	1,454
多発性囊胞腎	8,069 (%)	237 (2.8)	202 (2.4)	8,508 (100.0)	48	2,915	11,471
腎硬化症	21,904 (%)	939 (4.0)	523 (2.2)	23,366 (100.0)	87	8,197	31,650
悪性高血圧	1,837 (%)	89 (4.5)	55 (2.8)	1,981 (100.0)	4	736	2,721
糖尿病性腎症	86,752 (%)	2,370 (2.6)	1,690 (1.9)	90,812 (100.0)	311	32,534	123,657
SLE腎炎	1,568 (%)	43 (2.6)	54 (3.2)	1,665 (100.0)	3	554	2,222
アミロイド腎	300 (%)	11 (3.4)	8 (2.5)	319 (100.0)	2	117	438
痛風腎	746 (%)	25 (3.1)	33 (4.1)	804 (100.0)	3	249	1,056
先天性代謝異常による腎不全	186 (%)	13 (6.1)	15 (7.0)	214 (100.0)		67	281
腎・尿路結核	113 (%)	1 (0.8)	7 (5.8)	121 (100.0)	1	46	168
腎・尿路結石	412 (%)	20 (4.6)	7 (1.6)	439 (100.0)	4	135	578
腎・尿路腫瘍	697 (%)	11 (1.5)	14 (1.9)	722 (100.0)	2	235	959
閉塞性尿路障害	531 (%)	15 (2.7)	18 (3.2)	564 (100.0)	1	178	743
骨髄腫	230 (%)	7 (2.9)	2 (0.8)	239 (100.0)		84	323
腎形成不全	381 (%)	55 (11.2)	57 (11.6)	493 (100.0)		171	664
不明	20,719 (%)	741 (3.4)	633 (2.9)	22,093 (100.0)	196	9,123	31,412
再導入	1,476 (%)	66 (4.0)	107 (6.5)	1,649 (100.0)	6	519	2,174
その他	5,505 (%)	241 (4.1)	199 (3.3)	5,945 (100.0)	21	2,472	8,438
合計	218,974 (%)	7,597 (3.2)	7,223 (3.1)	233,794 (100.0)	1,002	84,313	319,109
記載なし							
(%)							
総計	218,974 (%)	7,597 (3.2)	7,223 (3.1)	233,794 (100.0)	1,002	84,313	319,109

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D0916##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査