

表 715 腹膜透析の経験 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	なし	あり		合計	不明	記載なし	総計
		年末時点 カテーテル あり	年末時点 カテーテル なし				
慢性糸球体腎炎	42,846 (%)	327 (0.7)	2,072 (4.6)	45,245 (100.0)	243	11,684	57,172
慢性腎孟腎炎	1,393 (%)	11 (0.7)	82 (5.5)	1,486 (100.0)	9	373	1,868
急速進行性糸球体腎炎	1,324 (%)	3 (0.2)	28 (2.1)	1,355 (100.0)	3	329	1,687
妊娠腎/妊娠中毒症	619 (%)	6 (0.9)	31 (4.7)	656 (100.0)	2	191	849
その他の分類不能の腎炎	623 (%)	8 (1.2)	25 (3.8)	656 (100.0)	7	239	902
多発性囊胞腎	5,806 (%)	28 (0.5)	126 (2.1)	5,960 (100.0)	43	1,545	7,548
腎硬化症	16,512 (%)	82 (0.5)	373 (2.2)	16,967 (100.0)	74	4,477	21,518
悪性高血圧	1,332 (%)	12 (0.9)	43 (3.1)	1,387 (100.0)	4	386	1,777
糖尿病性腎症	65,231 (%)	262 (0.4)	1,186 (1.8)	66,679 (100.0)	280	17,509	84,468
SLE腎炎	1,067 (%)	6 (0.5)	30 (2.7)	1,103 (100.0)	3	264	1,370
アミロイド腎	218 (%)		7 (3.1)	225 (100.0)	1	54	280
痛風腎	543 (%)	4 (0.7)	20 (3.5)	567 (100.0)	2	131	700
先天性代謝異常による腎不全	125 (%)		9 (6.7)	134 (100.0)		35	169
腎・尿路結核	75 (%)		3 (3.8)	78 (100.0)	1	27	106
腎・尿路結石	308 (%)	3 (0.9)	5 (1.6)	316 (100.0)	4	64	384
腎・尿路腫瘍	518 (%)	2 (0.4)	10 (1.9)	530 (100.0)	2	112	644
閉塞性尿路障害	378 (%)		11 (2.8)	389 (100.0)	1	75	465
骨髄腫	171 (%)	1 (0.6)	1 (0.6)	173 (100.0)		40	213
腎形成不全	254 (%)	7 (2.4)	35 (11.8)	296 (100.0)		72	368
不明	14,976 (%)	89 (0.6)	397 (2.6)	15,462 (100.0)	176	4,840	20,478
再導入	894 (%)	12 (1.2)	62 (6.4)	968 (100.0)	4	192	1,164
その他	3,961 (%)	34 (0.8)	127 (3.1)	4,122 (100.0)	19	1,265	5,406
合計	159,174 (%)	897 (0.5)	4,683 (2.8)	164,754 (100.0)	878	43,904	209,536
記載なし							
(%)							
総計	159,174 (%)	897 (0.5)	4,683 (2.8)	164,754 (100.0)	878	43,904	209,536

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D0923##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査