

表 720 腹膜透析の経験 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	なし	あり		合計	不明	記載なし	総計
		年末時点 カテーテル あり	年末時点 カテーテル なし				
慢性糸球体腎炎 (%)	16,542 (93.2)	147 (0.8)	1,064 (6.0)	17,753 (100.0)	27	4,608	22,388
慢性腎孟腎炎 (%)	468 (92.3)		39 (7.7)	507 (100.0)		120	627
急速進行性糸球体腎炎 (%)	362 (95.0)	5 (1.3)	14 (3.7)	381 (100.0)		103	484
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	334 (93.0)	1 (0.3)	24 (6.7)	359 (100.0)	1	99	459
その他の分類不能の腎炎 (%)	276 (93.6)	2 (0.7)	17 (5.8)	295 (100.0)		60	355
多発性囊胞腎 (%)	1,956 (96.6)	5 (0.2)	64 (3.2)	2,025 (100.0)	2	542	2,569
腎硬化症 (%)	4,538 (96.9)	22 (0.5)	125 (2.7)	4,685 (100.0)	8	1,203	5,896
悪性高血圧 (%)	420 (97.0)	2 (0.5)	11 (2.5)	433 (100.0)		122	555
糖尿病性腎症 (%)	18,886 (97.5)	63 (0.3)	430 (2.2)	19,379 (100.0)	19	5,118	24,516
SLE腎炎 (%)	423 (96.1)		17 (3.9)	440 (100.0)		97	537
アミロイド腎 (%)	77 (98.7)		1 (1.3)	78 (100.0)	1	19	98
痛風腎 (%)	170 (93.4)	3 (1.6)	9 (4.9)	182 (100.0)		45	227
先天性代謝異常による腎不全 (%)	55 (90.2)		6 (9.8)	61 (100.0)		12	73
腎・尿路結核 (%)	34 (94.4)		2 (5.6)	36 (100.0)		8	44
腎・尿路結石 (%)	85 (97.7)		2 (2.3)	87 (100.0)		26	113
腎・尿路腫瘍 (%)	151 (97.4)	1 (0.6)	3 (1.9)	155 (100.0)		35	190
閉塞性尿路障害 (%)	109 (94.0)	1 (0.9)	6 (5.2)	116 (100.0)		35	151
骨髄腫 (%)	29 (96.7)		1 (3.3)	30 (100.0)		7	37
腎形成不全 (%)	115 (85.8)		19 (14.2)	134 (100.0)		37	171
不明 (%)	4,840 (95.7)	28 (0.6)	191 (3.8)	5,059 (100.0)	7	1,465	6,531
再導入 (%)	492 (92.0)	4 (0.7)	39 (7.3)	535 (100.0)	2	96	633
その他 (%)	1,250 (94.3)	11 (0.8)	64 (4.8)	1,325 (100.0)	2	393	1,720
合計 (%)	51,612 (95.5)	295 (0.5)	2,148 (4.0)	54,055 (100.0)	69	14,250	68,374
記載なし (%)							
総計 (%)	51,612 (95.5)	295 (0.5)	2,148 (4.0)	54,055 (100.0)	69	14,250	68,374

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0933##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査