

表 745 週透析回数(回/週) 治療方法別 (透析患者全体)

治療方法	0.5回 (1回 /2週間)	1回	2回	2.5回 (5回 /2Week)	3回	3.5回 (隔日)	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	569 (0.3)	4,832 (2.2)	3 (0.0)	209,536 (97.1)	21 (0.0)	753 (0.3)	20 (0.0)	45 (0.0)	1 (0.0)	215,780 (100.0)	17,924	233,704	2.98	0.20	
血液透析濾過 (%)	110 (0.2)	725 (1.0)		68,374 (98.3)		308 (0.4)	5 (0.0)	20 (0.0)		69,542 (100.0)	5,257	74,799	2.99	0.15	
血液濾過 (%)				19 (100.0)						19 (100.0)		19	3.00		
血液吸着透析 (%)	3 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,271 (99.2)	1 (0.1)	4 (0.3)				1,281 (100.0)	74	1,355	3.00	0.12	
在宅血液透析 (%)	17 (3.4)	4 (0.8)		89 (18.0)	25 (5.1)	154 (31.2)	84 (17.0)	96 (19.4)	25 (5.1)	494 (100.0)	123	617	4.39	1.34	
腹膜透析 (%)	1,242 (92.5)	97 (7.2)		4 (0.3)						1,343 (100.0)	7,272	8,615	1.08	0.28	
合計 (%)	1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,293 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,459 (100.0)	30,650	319,109	2.97	0.24	
記載なし (%)															
総計 (%)	1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,293 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,459 (100.0)	30,650	319,109	2.97	0.24	

数値下のいっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1110##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査