

表 746 週透析回数(回/週) 治療方法(新分類)別 (透析患者全体)

治療方法 (新分類)	0.5回 (1回 /2週間)	1回	2回	2.5回 (5回 /2Week)	3回	3.5回 (隔日)	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)		569 (0.3)	4,832 (2.2)	3 (0.0)	209,536 (97.1)	21 (0.0)	753 (0.3)	20 (0.0)	45 (0.0)	1 (0.0)	215,780 (100.0)	17,924	233,704	2.98	0.20
Off-line HDF (%)		5 (0.1)	28 (0.7)		4,188 (98.7)		20 (0.5)	1 (0.0)			4,242 (100.0)	395	4,637	3.00	0.13
On-line HDF (%)		84 (0.2)	524 (1.0)		53,832 (98.4)		261 (0.5)	4 (0.0)	11 (0.0)		54,716 (100.0)	4,400	59,116	2.99	0.15
Push/Pull HDF (%)				65 (100.0)						65 (100.0)	1	66	3.00		
バイオフィルトレーション (%)				232 (98.3)			1 (0.4)		3 (1.3)	236 (100.0)	16	252	3.04	0.34	
IHDF (%)		21 (0.2)	173 (1.7)		10,057 (97.8)		26 (0.3)		6 (0.1)	10,283 (100.0)	445	10,728	2.98	0.18	
血液濾過 (%)				19 (100.0)						19 (100.0)		19	3.00		
血液吸着透析 (リクセル等使用) (%)		3 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,271 (99.2)	1 (0.1)	4 (0.3)			1,281 (100.0)	74	1,355	3.00	0.12	
在宅血液透析 (%)		17 (3.4)	4 (0.8)		89 (18.0)	25 (5.1)	154 (31.2)	84 (17.0)	96 (19.4)	25 (5.1)	494 (100.0)	123	617	4.39	1.34
腹膜透析 (CAPD) (%)		601 (90.4)	61 (9.2)		3 (0.5)					665 (100.0)	4,308	4,973	1.10	0.32	
腹膜透析 (APD) (%)		384 (95.0)	20 (5.0)							404 (100.0)	2,233	2,637	1.05	0.22	
腹膜透析 (CCPD) (%)		257 (93.8)	16 (5.8)		1 (0.4)					274 (100.0)	731	1,005	1.07	0.26	
合計 (%)		1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,293 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,459 (100.0)	30,650	319,109	2.97	0.24
記載なし (%)															
総計 (%)		1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,293 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,459 (100.0)	30,650	319,109	2.97	0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D1111##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査