

表 747 週透析回数(回/週) 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	0.5回 (1回 /2週間)	1回	2回	2.5回 (5回 /2Week)	3回	3.5回 (隔日)	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)	691 (0.2)	5,515 (1.9)	4 (0.0)	279,078 (97.3)	47 (0.0)	1,217 (0.4)	108 (0.0)	159 (0.1)	25 (0.0)	286,844 (100.0)	23,294	310,138	2.98	0.20	
PD単独 (%)											6,931	6,931			
HD(F)単独.PDカテあり (%)		1 (0.6)	3 (1.8)		160 (96.4)			1 (0.6)	1 (0.6)	166 (100.0)	11	177	3.00	0.35	
PD.HD併用週1HD(F) (%)		1,230 (100.0)								1,230 (100.0)	266	1,496	1.00		
PD.HD併用週2HD(F) (%)			140 (100.0)							140 (100.0)	25	165	2.00		
PD.HD併用週3HD(F) (%)				34 (100.0)						34 (100.0)	3	37	3.00		
PD.HD併用週4HD(F) (%)						1 (100.0)				1 (100.0)		1	4.00		
PD.HD併用その他 (%)		18 (66.7)	1 (3.7)		8 (29.6)					27 (100.0)	36	63	1.63	0.93	
合計 (%)	1,940 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,280 (96.8)	47 (0.0)	1,218 (0.4)	109 (0.0)	160 (0.1)	25 (0.0)	288,442 (100.0)	30,566	319,008	2.97	0.24	
不明 (%)		1 (5.9)			13 (76.5)		1 (5.9)		1 (5.9)	1 (5.9)	17 (100.0)	5	22	3.35	1.32
記載なし (%)											79	79			
総計 (%)		1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,293 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,459 (100.0)	30,650	319,109	2.97	0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1112##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査