

表 750 週透析回数(回/週) 透析歴(年)別 (透析患者全体)

| 透析歴 | 0.5回 (1回 /2週間) | 1回 | 2回 | 2.5回 (5回 /2Week) | 3回 | 3.5回 (隔日) | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------|---------|------|------|
| 2年末満 (%) | | 450 (0.7) | 2,743 (4.4) | | 58,284 (94.4) | | 192 (0.3) | 15 (0.0) | 32 (0.1) | 2 (0.0) | 61,718 (100.0) | 8,820 | 70,538 | 2.95 | 0.28 |
| 2年~ (%) | | 623 (0.9) | 1,544 (2.2) | | 69,323 (96.6) | 8 (0.0) | 237 (0.3) | 19 (0.0) | 38 (0.1) | 5 (0.0) | 71,797 (100.0) | 8,371 | 80,168 | 2.97 | 0.26 |
| 5年~ (%) | | 595 (0.8) | 908 (1.3) | | 70,338 (97.4) | 7 (0.0) | 325 (0.4) | 28 (0.0) | 35 (0.0) | 7 (0.0) | 72,243 (100.0) | 6,902 | 79,145 | 2.98 | 0.24 |
| 10年~ (%) | | 161 (0.4) | 256 (0.7) | | 36,900 (98.2) | 7 (0.0) | 202 (0.5) | 21 (0.1) | 26 (0.1) | 6 (0.0) | 37,579 (100.0) | 2,977 | 40,556 | 2.99 | 0.20 |
| 15年~ (%) | | 47 (0.2) | 108 (0.5) | 1 (0.0) | 20,153 (98.5) | 9 (0.0) | 109 (0.5) | 14 (0.1) | 14 (0.1) | 3 (0.0) | 20,458 (100.0) | 1,636 | 22,094 | 3.00 | 0.18 |
| 20年~ (%) | | 18 (0.2) | 39 (0.3) | | 11,430 (98.7) | 10 (0.1) | 66 (0.6) | 7 (0.1) | 9 (0.1) | 3 (0.0) | 11,582 (100.0) | 902 | 12,484 | 3.00 | 0.17 |
| 25年~ (%) | | 12 (0.2) | 21 (0.3) | 1 (0.0) | 6,341 (98.6) | 1 (0.0) | 49 (0.8) | 4 (0.1) | 5 (0.1) | | 6,434 (100.0) | 463 | 6,897 | 3.00 | 0.17 |
| 30年~ (%) | | 8 (0.2) | 9 (0.2) | | 3,628 (98.9) | 2 (0.1) | 19 (0.5) | 1 (0.0) | 2 (0.1) | | 3,669 (100.0) | 318 | 3,987 | 3.00 | 0.15 |
| 35年~ (%) | | 1 (0.0) | 9 (0.4) | 2 (0.1) | 1,987 (98.6) | 3 (0.1) | 13 (0.6) | | | | 2,015 (100.0) | 137 | 2,152 | 3.00 | 0.12 |
| 40年~ (%) | | 2 (0.3) | 2 (0.3) | | 731 (98.8) | | 5 (0.7) | | | | 740 (100.0) | 53 | 793 | 3.00 | 0.14 |
| 合計 (%) | | 1,917 (0.7) | 5,639 (2.0) | 4 (0.0) | 279,115 (96.8) | 47 (0.0) | 1,217 (0.4) | 109 (0.0) | 161 (0.1) | 26 (0.0) | 288,235 (100.0) | 30,579 | 318,814 | 2.97 | 0.24 |
| 不明 (%) | | 24 (10.7) | 20 (8.9) | | 178 (79.5) | | 2 (0.9) | | | | 224 (100.0) | 71 | 295 | 2.71 | 0.66 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | | 1,941 (0.7) | 5,659 (2.0) | 4 (0.0) | 279,293 (96.8) | 47 (0.0) | 1,219 (0.4) | 109 (0.0) | 161 (0.1) | 26 (0.0) | 288,459 (100.0) | 30,650 | 319,109 | 2.97 | 0.24 |
| 平均 | | 5.06 | 3.20 | 28.25 | 7.58 | 15.74 | 9.27 | 9.65 | 7.89 | 9.42 | 7.48 | 6.07 | 7.35 | | |
| 標準偏差 | | 5.03 | 4.59 | 8.30 | 7.68 | 9.84 | 8.41 | 7.61 | 7.51 | 6.34 | 7.65 | 7.02 | 7.60 | | |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1115##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査