

表 751 週透析回数(回/週) 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	0.5回 (1回 /2週間)	1回	2回	2.5回 (5回 /2Week)	3回	3.5回 (隔日)	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		636 (0.8)	1,300 (1.6)	2 (0.0)	80,502 (97.0)	18 (0.0)	367 (0.4)	54 (0.1)	70 (0.1)	12 (0.0)	82,961 (100.0)	8,822	91,783	2.98	0.25
慢性腎盂腎炎 (%)		25 (1.0)	69 (2.6)	1 (0.0)	2,513 (95.8)	2 (0.1)	9 (0.3)	4 (0.2)	1 (0.0)		2,624 (100.0)	272	2,896	2.96	0.28
急速進行性糸球体腎炎 (%)		20 (0.9)	79 (3.5)		2,177 (95.2)		8 (0.3)	1 (0.0)	2 (0.1)		2,287 (100.0)	251	2,538	2.95	0.28
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		6 (0.4)	8 (0.6)	1 (0.1)	1,347 (98.1)	1 (0.1)	10 (0.7)				1,373 (100.0)	110	1,483	2.99	0.18
その他の分類不能の腎炎 (%)		17 (1.3)	21 (1.6)		1,270 (96.4)		6 (0.5)		2 (0.2)	2 (0.2)	1,318 (100.0)	136	1,454	2.97	0.33
多発性嚢胞腎 (%)		48 (0.5)	216 (2.1)		10,161 (96.8)	4 (0.0)	49 (0.5)	6 (0.1)	8 (0.1)	1 (0.0)	10,493 (100.0)	978	11,471	2.98	0.23
腎硬化症 (%)		195 (0.7)	687 (2.4)		27,445 (96.5)		105 (0.4)	5 (0.0)	17 (0.1)		28,454 (100.0)	3,196	31,650	2.97	0.25
悪性高血圧 (%)		29 (1.2)	62 (2.5)		2,344 (95.9)		7 (0.3)		1 (0.0)		2,443 (100.0)	278	2,721	2.95	0.28
糖尿病性腎症 (%)		566 (0.5)	1,992 (1.8)		109,076 (97.3)	9 (0.0)	447 (0.4)	20 (0.0)	35 (0.0)	7 (0.0)	112,152 (100.0)	11,505	123,657	2.98	0.21
SLE 腎炎 (%)		6 (0.3)	56 (2.8)		1,925 (96.3)	1 (0.1)	8 (0.4)		2 (0.1)		1,998 (100.0)	224	2,222	2.97	0.23
アミロイド腎 (%)		4 (1.0)	4 (1.0)		379 (97.4)		1 (0.3)	1 (0.3)			389 (100.0)	49	438	2.98	0.25
痛風腎 (%)		7 (0.7)	17 (1.8)		936 (96.9)		6 (0.6)				966 (100.0)	90	1,056	2.97	0.23
先天性代謝異常による腎不全 (%)		4 (1.6)	5 (2.0)		243 (96.4)						252 (100.0)	29	281	2.95	0.28
腎・尿路結核 (%)			1 (0.6)		154 (98.7)				1 (0.6)		156 (100.0)	12	168	3.01	0.25
腎・尿路結石 (%)		6 (1.1)	15 (2.9)		499 (95.6)		1 (0.2)	1 (0.2)			522 (100.0)	56	578	2.95	0.29
腎・尿路腫瘍 (%)		7 (0.8)	23 (2.7)		835 (96.4)		1 (0.1)				866 (100.0)	93	959	2.96	0.24
閉塞性尿路障害 (%)		6 (0.9)	35 (5.3)		621 (93.4)		3 (0.5)				665 (100.0)	78	743	2.93	0.30
骨髄腫 (%)		6 (2.1)	30 (10.4)		250 (86.8)		2 (0.7)				288 (100.0)	35	323	2.86	0.42
腎形成不全 (%)		3 (0.5)	9 (1.6)		545 (96.8)		6 (1.1)				563 (100.0)	101	664	2.98	0.22
不明 (%)		258 (0.9)	737 (2.6)		27,098 (95.9)	9 (0.0)	114 (0.4)	13 (0.0)	13 (0.0)	3 (0.0)	28,245 (100.0)	3,167	31,412	2.96	0.27
再導入 (%)		19 (1.0)	53 (2.8)		1,826 (95.3)	2 (0.1)	11 (0.6)	2 (0.1)	4 (0.2)		1,917 (100.0)	257	2,174	2.97	0.31
その他 (%)		73 (1.0)	240 (3.2)		7,147 (95.0)	1 (0.0)	58 (0.8)	2 (0.0)	5 (0.1)	1 (0.0)	7,527 (100.0)	911	8,438	2.96	0.29
合計 (%)		1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,293 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,459 (100.0)	30,650	319,109	2.97	0.24
記載なし (%)															
総計 (%)		1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,293 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,459 (100.0)	30,650	319,109	2.97	0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1116##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査