

表 766 透析時間(分/回) 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

原疾患	180未満	180~	210~	240~	270~	300~	330~	360~	390~	420~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	82 (%) (0.1)	4,567 (8.0)	3,641 (6.4)	39,528 (69.3)	3,594 (6.3)	4,787 (8.4)	219 (0.4)	367 (0.6)	21 (0.0)	219 (0.4)	57,025 (100.0)	147	57,172	242.81	32.51
慢性腎盂腎炎	4 (%) (0.2)	202 (10.8)	151 (8.1)	1,244 (66.6)	83 (4.4)	153 (8.2)	5 (0.3)	20 (1.1)	5 (0.3)	1,867 (100.0)	1	1,868	239.89	34.28	
急速進行性糸球体腎炎	7 (%) (0.4)	216 (12.8)	117 (6.9)	1,176 (69.8)	60 (3.6)	100 (5.9)	3 (0.2)	3 (0.2)	1 (0.1)	2,1685 (0.1)	2	1,687	235.65	30.50	
妊娠腎/妊娠中毒症	1 (%) (0.1)	47 (5.6)	52 (6.2)	626 (74.1)	62 (7.3)	49 (5.8)	3 (0.4)	2 (0.2)	3 (0.2)	845 (0.4)	4	849	242.66	28.40	
その他の分類不能の腎炎	3 (%) (0.3)	87 (9.7)	59 (6.6)	599 (66.8)	57 (6.4)	74 (8.2)	2 (0.2)	3 (0.3)	13 (1.4)	897 (100.0)	5	902	243.57	40.47	
多発性囊胞腎	8 (%) (0.1)	718 (9.5)	621 (8.2)	5,163 (68.5)	418 (5.5)	529 (7.0)	14 (0.2)	29 (0.4)	35 (0.4)	7,535 (0.5)	13	7,548	240.03	32.48	
腎硬化症	53 (%) (0.2)	3,160 (14.7)	1,955 (9.1)	14,304 (66.6)	763 (3.6)	1,076 (5.0)	30 (0.1)	95 (0.4)	5 (0.0)	21,478 (0.2)	40	21,518	234.05	31.35	
悪性高血圧	4 (%) (0.2)	199 (11.2)	129 (7.3)	1,169 (65.9)	107 (6.0)	150 (8.5)	5 (0.3)	7 (0.4)	3 (0.2)	1,773 (100.0)	4	1,777	239.54	31.46	
糖尿病性腎症	173 (%) (0.2)	9,120 (10.8)	6,255 (7.4)	58,438 (69.4)	3,822 (4.5)	5,581 (6.6)	194 (0.2)	469 (0.6)	24 (0.0)	153 (0.2)	84,229 (100.0)	239	84,468	238.39	30.96
SLE腎炎	3 (%) (0.2)	141 (10.3)	100 (7.3)	932 (68.3)	76 (5.6)	95 (7.0)	4 (0.3)	7 (0.5)	1 (0.1)	6 (0.4)	1,365 (100.0)	5	1,370	239.99	33.63
アミロイド腎	44 (%) (15.7)	32 (11.4)	174 (62.1)	10 (3.6)	17 (6.1)	1 (0.4)	2 (0.7)			280 (100.0)		280	233.67	31.78	
痛風腎	4 (%) (0.6)	66 (9.5)	51 (7.3)	489 (70.3)	35 (5.0)	39 (5.6)	1 (0.1)	7 (1.0)	4 (0.6)	696 (100.0)	4	700	239.51	33.73	
先天性代謝異常による腎不全	1 (%) (0.6)	18 (10.7)	9 (5.3)	115 (68.0)	11 (6.5)	13 (7.7)			2 (1.2)	169 (100.0)		169	239.75	32.30	
腎・尿路結核	10 (%) (9.4)	12 (11.3)	77 (72.6)	5 (4.7)	2 (1.9)					106 (100.0)		106	233.83	22.84	
腎・尿路結石	35 (%) (9.1)	28 (7.3)	279 (72.7)	21 (5.5)	19 (4.9)	1 (0.3)				1 (0.3)	384 (100.0)		384	238.49	27.87
腎・尿路腫瘍	3 (%) (0.5)	75 (11.6)	48 (7.5)	454 (70.5)	26 (4.0)	28 (4.3)	1 (0.2)	5 (0.8)	4 (0.6)	644 (100.0)		644	237.04	34.07	
閉塞性尿路障害	3 (%) (0.6)	62 (13.4)	43 (9.3)	295 (63.6)	17 (3.7)	37 (8.0)	3 (0.6)	1 (0.2)	3 (0.6)	464 (100.0)	1	465	237.35	37.95	
骨髄腫	1 (%) (0.5)	60 (28.3)	16 (7.5)	124 (58.5)	3 (1.4)	8 (3.8)				212 (100.0)		213	223.81	31.99	
腎形成不全	29 (%) (7.9)	22 (6.0)	250 (68.1)	31 (8.4)	31 (8.4)	1 (0.3)	2 (0.5)		1 (0.3)	367 (100.0)		1	368	243.66	30.94
不明	84 (%) (0.4)	3,023 (14.8)	1,814 (8.9)	13,583 (66.6)	830 (4.1)	889 (4.4)	36 (0.2)	82 (0.4)	3 (0.0)	58 (0.3)	20,402 (100.0)	76	20,478	233.96	32.38
再導入	5 (%) (0.4)	81 (7.0)	68 (5.9)	770 (66.7)	87 (7.5)	119 (10.3)	4 (0.3)	9 (0.8)	2 (0.2)	9 (0.8)	1,154 (100.0)	10	1,164	246.35	37.20
その他	31 (%) (0.6)	736 (13.7)	415 (7.7)	3,573 (66.3)	262 (4.9)	305 (5.7)	15 (0.3)	28 (0.5)	1 (0.0)	23 (0.4)	5,389 (100.0)	17	5,406	236.57	34.81
合計	470 (%) (0.2)	22,696 (10.9)	15,638 (7.5)	143,362 (68.6)	10,380 (5.0)	14,101 (6.7)	542 (0.3)	1,140 (0.5)	58 (0.0)	579 (0.3)	208,966 (100.0)	570	209,536	238.81	32.04
記載なし															
総計	470 (%) (0.2)	22,696 (10.9)	15,638 (7.5)	143,362 (68.6)	10,380 (5.0)	14,101 (6.7)	542 (0.3)	1,140 (0.5)	58 (0.0)	579 (0.3)	208,966 (100.0)	570	209,536	238.81	32.04

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1213##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査