

表 768 透析時間(分/回) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	180未満	180～	210～	240～	270～	300～	330～	360～	390～	420～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	63 (0.1)	2,414 (5.5)	2,870 (6.5)	30,061 (68.3)	3,928 (8.9)	4,143 (9.4)	194 (0.4)	284 (0.6)	10 (0.0)	72 (0.2)	44,039 (100.0)	106	44,145	245.71	30.67
女性 (%)	43 (0.2)	1,897 (7.8)	1,894 (7.8)	16,678 (69.0)	1,694 (7.0)	1,729 (7.2)	81 (0.3)	120 (0.5)	9 (0.0)	29 (0.1)	24,174 (100.0)	55	24,229	241.57	30.55
合計 (%)	106 (0.2)	4,311 (6.3)	4,764 (7.0)	46,739 (68.5)	5,622 (8.2)	5,872 (8.6)	275 (0.4)	404 (0.6)	19 (0.0)	101 (0.1)	68,213 (100.0)	161	68,374	244.24	30.69
記載なし (%)															
総計 (%)	106 (0.2)	4,311 (6.3)	4,764 (7.0)	46,739 (68.5)	5,622 (8.2)	5,872 (8.6)	275 (0.4)	404 (0.6)	19 (0.0)	101 (0.1)	68,213 (100.0)	161	68,374	244.24	30.69

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1220##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査