

表 778 血流量(ml/分) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 性別 | 100未満 | 100～ | 120～ | 140～ | 160～ | 180～ | 200～ | 220～ | 240～ | 260～ | 280～ | 300～ | 350～ | 400～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|--------|--------|-------|
| 男性 | 1 | 26 | 79 | 922 | 334 | 2,171 | 13,071 | 7,433 | 12,238 | 1,256 | 1,603 | 3,663 | 523 | 234 | 43,554 | 591 | 44,145 | 231.78 | 40.43 |
| (%) | (0.0) | (0.1) | (0.2) | (2.1) | (0.8) | (5.0) | (30.0) | (17.1) | (28.1) | (2.9) | (3.7) | (8.4) | (1.2) | (0.5) | (100.0) | | | | |
| 女性 | 1 | 29 | 118 | 1,411 | 550 | 2,716 | 9,951 | 3,590 | 3,972 | 309 | 377 | 684 | 85 | 49 | 23,842 | 387 | 24,229 | 211.27 | 35.59 |
| (%) | (0.0) | (0.1) | (0.5) | (5.9) | (2.3) | (11.4) | (41.7) | (15.1) | (16.7) | (1.3) | (1.6) | (2.9) | (0.4) | (0.2) | (100.0) | | | | |
| 合計 | 2 | 55 | 197 | 2,333 | 884 | 4,887 | 23,022 | 11,023 | 16,210 | 1,565 | 1,980 | 4,347 | 608 | 283 | 67,396 | 978 | 68,374 | 224.53 | 40.01 |
| (%) | (0.0) | (0.1) | (0.3) | (3.5) | (1.3) | (7.3) | (34.2) | (16.4) | (24.1) | (2.3) | (2.9) | (6.4) | (0.9) | (0.4) | (100.0) | | | | |
| 記載なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 | 2 | 55 | 197 | 2,333 | 884 | 4,887 | 23,022 | 11,023 | 16,210 | 1,565 | 1,980 | 4,347 | 608 | 283 | 67,396 | 978 | 68,374 | 224.53 | 40.01 |
| (%) | (0.0) | (0.1) | (0.3) | (3.5) | (1.3) | (7.3) | (34.2) | (16.4) | (24.1) | (2.3) | (2.9) | (6.4) | (0.9) | (0.4) | (100.0) | | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D1320##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査