

表 781 血流量(ml/分) 原疾患別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		8 (0.0)	36 (0.2)	513 (2.3)	245 (1.1)	1,376 (6.2)	7,148 (32.5)	3,965 (18.0)	5,682 (25.8)	557 (2.5)	742 (3.4)	1,452 (6.6)	191 (0.9)	106 (0.5)	22,021 (100.0)	367	22,388	227.53	39.07
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (0.2)	2 (0.3)	25 (4.1)	4 (0.7)	54 (8.8)	215 (35.0)	99 (16.1)	143 (23.3)	15 (2.4)	24 (3.9)	29 (4.7)	4 (0.7)		615 (100.0)	12	627	221.41	37.33
急速進行性糸球体腎炎 (%)			1 (0.2)	20 (4.2)	4 (0.8)	44 (9.2)	170 (35.7)	75 (15.8)	98 (20.6)	9 (1.9)	21 (4.4)	32 (6.7)	2 (0.4)		476 (100.0)	8	484	221.52	37.98
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)			1 (0.2)	15 (3.3)	11 (2.4)	46 (10.1)	167 (36.7)	84 (18.5)	84 (18.5)	7 (1.5)	15 (3.3)	21 (4.6)	3 (0.7)	1 (0.2)	455 (100.0)	4	459	218.43	38.19
その他の分類不能の腎炎 (%)		1 (0.3)	1 (0.3)	12 (3.5)	8 (2.3)	19 (5.5)	100 (28.8)	58 (16.7)	90 (25.9)	8 (2.3)	11 (3.2)	32 (9.2)	6 (1.7)	1 (0.3)	347 (100.0)	8	355	229.47	42.84
多発性嚢胞腎 (%)		1 (0.0)	2 (0.1)	58 (2.3)	32 (1.3)	121 (4.8)	843 (33.2)	437 (17.2)	662 (26.1)	71 (2.8)	84 (3.3)	201 (7.9)	18 (0.7)	10 (0.4)	2,540 (100.0)	29	2,569	228.61	38.56
腎硬化症 (%)	2 (0.0)	9 (0.2)	26 (0.4)	357 (6.2)	118 (2.0)	567 (9.8)	2,173 (37.4)	778 (13.4)	1,142 (19.7)	124 (2.1)	114 (2.0)	334 (5.8)	41 (0.7)	18 (0.3)	5,803 (100.0)	93	5,896	217.09	40.63
悪性高血圧 (%)			2 (0.4)	16 (2.9)	7 (1.3)	33 (6.0)	153 (27.9)	95 (17.3)	151 (27.5)	16 (2.9)	15 (2.7)	49 (8.9)	6 (1.1)	6 (1.1)	549 (100.0)	6	555	231.53	44.75
糖尿病性腎症 (%)		20 (0.1)	64 (0.3)	880 (3.6)	293 (1.2)	1,803 (7.5)	8,427 (34.9)	3,855 (16.0)	5,780 (23.9)	528 (2.2)	657 (2.7)	1,527 (6.3)	230 (1.0)	98 (0.4)	24,162 (100.0)	354	24,516	223.92	39.92
SLE腎炎 (%)			3 (0.6)	17 (3.2)	8 (1.5)	56 (10.5)	207 (38.8)	89 (16.7)	110 (20.6)	9 (1.7)	15 (2.8)	18 (3.4)		1 (0.2)	533 (100.0)	4	537	216.72	35.22
アミロイド腎 (%)		1 (1.0)	1 (1.0)	9 (9.3)		13 (13.4)	34 (35.1)	11 (11.3)	24 (24.7)	1 (1.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	1 (1.0)		97 (100.0)	1	98	210.00	38.38
痛風腎 (%)		1 (0.4)	2 (0.9)	1 (0.4)	2 (0.9)	9 (4.0)	70 (31.3)	38 (17.0)	70 (31.3)	6 (2.7)	8 (3.6)	15 (6.7)	2 (0.9)		224 (100.0)	3	227	229.51	36.52
先天性代謝異常による腎不全 (%)				2 (2.7)	2 (2.7)	5 (6.8)	29 (39.7)	10 (13.7)	19 (26.0)	1 (1.4)	1 (1.4)	4 (5.5)			73 (100.0)		73	219.93	33.55
腎・尿路結核 (%)				1 (2.3)	1 (2.3)	5 (11.4)	18 (40.9)	5 (11.4)	11 (25.0)	1 (2.3)		2 (4.5)			44 (100.0)		44	217.27	33.30
腎・尿路結石 (%)				2 (1.9)	2 (1.9)	10 (9.3)	29 (27.1)	23 (21.5)	32 (29.9)	3 (2.8)	1 (0.9)	4 (3.7)		1 (0.9)	107 (100.0)	6	113	225.89	41.41
腎・尿路腫瘍 (%)			2 (1.1)	4 (2.2)	3 (1.6)	13 (7.0)	73 (39.2)	28 (15.1)	49 (26.3)	3 (1.6)	5 (2.7)	5 (2.7)	1 (0.5)		186 (100.0)	4	190	219.35	34.00
閉塞性尿路障害 (%)			1 (0.7)	7 (4.7)	5 (3.4)	11 (7.4)	45 (30.2)	26 (17.4)	34 (22.8)	4 (2.7)	5 (3.4)	8 (5.4)	2 (1.3)	1 (0.7)	149 (100.0)	2	151	222.68	42.47
骨髄腫 (%)				7 (18.9)	2 (5.4)	2 (5.4)	12 (32.4)	8 (21.6)	4 (10.8)		1 (2.7)	1 (2.7)			37 (100.0)		37	202.97	37.70
腎形成不全 (%)			2 (1.2)	8 (4.7)	1 (0.6)	10 (5.9)	39 (22.9)	44 (25.9)	43 (25.3)	6 (3.5)	7 (4.1)	8 (4.7)	1 (0.6)	1 (0.6)	170 (100.0)	1	171	226.29	39.82
不明 (%)		9 (0.1)	40 (0.6)	293 (4.5)	99 (1.5)	523 (8.1)	2,322 (35.8)	912 (14.1)	1,411 (21.8)	120 (1.9)	187 (2.9)	449 (6.9)	78 (1.2)	35 (0.5)	6,478 (100.0)	53	6,531	222.69	42.77
再導入 (%)				6 (1.0)	6 (1.0)	30 (4.8)	176 (28.2)	116 (18.6)	187 (30.0)	24 (3.8)	19 (3.0)	52 (8.3)	6 (1.0)	2 (0.3)	624 (100.0)	9	633	233.29	37.32
その他 (%)		4 (0.2)	11 (0.6)	80 (4.7)	31 (1.8)	137 (8.0)	572 (33.5)	267 (15.7)	384 (22.5)	52 (3.0)	47 (2.8)	103 (6.0)	16 (0.9)	2 (0.1)	1,706 (100.0)	14	1,720	221.57	40.15
合計 (%)	2 (0.0)	55 (0.1)	197 (0.3)	2,333 (3.5)	884 (1.3)	4,887 (7.3)	23,022 (34.2)	11,023 (16.4)	16,210 (24.1)	1,565 (2.3)	1,980 (2.9)	4,347 (6.4)	608 (0.9)	283 (0.4)	67,396 (100.0)	978	68,374	224.53	40.01
記載なし (%)																			
総計 (%)	2 (0.0)	55 (0.1)	197 (0.3)	2,333 (3.5)	884 (1.3)	4,887 (7.3)	23,022 (34.2)	11,023 (16.4)	16,210 (24.1)	1,565 (2.3)	1,980 (2.9)	4,347 (6.4)	608 (0.9)	283 (0.4)	67,396 (100.0)	978	68,374	224.53	40.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D1323##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査