

表 783 性別 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者)

| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 5歳未満 (%) | | 1 (0.0) | 1 (0.0) | | 1 (0.0) |
| 5歳～ (%) | | | | | |
| 10歳～ (%) | | | | | |
| 15歳～ (%) | 7 (0.0) | 3 (0.0) | 10 (0.0) | | 10 (0.0) |
| 20歳～ (%) | 31 (0.1) | 22 (0.1) | 53 (0.1) | | 53 (0.1) |
| 25歳～ (%) | 126 (0.3) | 65 (0.2) | 191 (0.3) | | 191 (0.3) |
| 30歳～ (%) | 349 (0.7) | 141 (0.5) | 490 (0.7) | | 490 (0.7) |
| 35歳～ (%) | 766 (1.6) | 308 (1.2) | 1,074 (1.4) | | 1,074 (1.4) |
| 40歳～ (%) | 1,684 (3.5) | 750 (2.8) | 2,434 (3.3) | | 2,434 (3.3) |
| 45歳～ (%) | 2,958 (6.1) | 1,203 (4.5) | 4,161 (5.6) | | 4,161 (5.6) |
| 50歳～ (%) | 3,719 (7.7) | 1,612 (6.1) | 5,331 (7.1) | | 5,331 (7.1) |
| 55歳～ (%) | 4,623 (9.6) | 2,218 (8.4) | 6,841 (9.1) | | 6,841 (9.1) |
| 60歳～ (%) | 6,192 (12.8) | 3,213 (12.1) | 9,405 (12.6) | | 9,405 (12.6) |
| 65歳～ (%) | 9,153 (19.0) | 5,049 (19.0) | 14,202 (19.0) | | 14,202 (19.0) |
| 70歳～ (%) | 6,761 (14.0) | 3,866 (14.6) | 10,627 (14.2) | | 10,627 (14.2) |
| 75歳～ (%) | 5,775 (12.0) | 3,538 (13.3) | 9,313 (12.5) | | 9,313 (12.5) |
| 80歳～ (%) | 3,937 (8.2) | 2,575 (9.7) | 6,512 (8.7) | | 6,512 (8.7) |
| 85歳～ (%) | 1,739 (3.6) | 1,458 (5.5) | 3,197 (4.3) | | 3,197 (4.3) |
| 90歳～ (%) | 434 (0.9) | 439 (1.7) | 873 (1.2) | | 873 (1.2) |
| 95歳～ (%) | 37 (0.1) | 47 (0.2) | 84 (0.1) | | 84 (0.1) |
| 合計 (%) | 48,291 (100.0) | 26,508 (100.0) | 74,799 (100.0) | | 74,799 (100.0) |
| 不明 | | | | | |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 48,291 | 26,508 | 74,799 | | 74,799 |
| 平均 | 65.42 | 67.49 | 66.15 | | 66.15 |
| 標準偏差 | 12.45 | 12.42 | 12.48 | | 12.48 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#D1410##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査