

表 791 HDF希釈方法 治療方法別(透析患者全体)

治療方法	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)							233,704 (90.9)	233,704 (73.2)
血液透析濾過 (%)	51,365 (99.7)	5,904 (99.3)	95 (100.0)	4,390 (100.0)	61,754 (99.7)	10 (100.0)	13,035 (5.1)	74,799 (23.4)
血液濾過 (%)							19 (0.0)	19 (0.0)
血液吸着透析 (%)							1,355 (0.5)	1,355 (0.4)
在宅血液透析 (%)							617 (0.2)	617 (0.2)
腹膜透析 (%)	155 (0.3)	42 (0.7)		1 (0.0)	198 (0.3)		8,417 (3.3)	8,615 (2.7)
合計 (%)	51,520 (100.0)	5,946 (100.0)	95 (100.0)	4,391 (100.0)	61,952 (100.0)	10 (100.0)	257,147 (100.0)	319,109 (100.0)
記載なし								
総計	51,520	5,946	95	4,391	61,952	10	257,147	319,109

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##D1510##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査