

表 795 HDF希釈方法 透析歴(年)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

透析歴	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	53	267			320		46	366
(%)	(16.6)	(83.4)			(100.0)			
2年～	90	549	3		642		86	728
(%)	(14.0)	(85.5)	(0.5)		(100.0)			
5年～	130	773	1	1	905		109	1,014
(%)	(14.4)	(85.4)	(0.1)	(0.1)	(100.0)			
10年～	79	549			628		69	697
(%)	(12.6)	(87.4)			(100.0)			
15年～	55	354	1	1	411		45	456
(%)	(13.4)	(86.1)	(0.2)	(0.2)	(100.0)			
20年～	35	278	1		314		29	343
(%)	(11.1)	(88.5)	(0.3)		(100.0)			
25年～	29	204			233		18	251
(%)	(12.4)	(87.6)			(100.0)			
30年～	17	142			159		17	176
(%)	(10.7)	(89.3)			(100.0)			
35年～	10	93			103		5	108
(%)	(9.7)	(90.3)			(100.0)			
40年～	3	39			42		4	46
(%)	(7.1)	(92.9)			(100.0)			
合計	501	3,248	6	2	3,757		428	4,185
(%)	(13.3)	(86.5)	(0.2)	(0.1)	(100.0)			
不明		2			2		1	3
(%)		(100.0)			(100.0)			
記載なし								
(%)								
総計	501	3,250	6	2	3,759		429	4,188
(%)	(13.3)	(86.5)	(0.2)	(0.1)	(100.0)			
平均	11.24	12.56	9.67	10.50	12.38		10.75	12.21
標準偏差	9.42	10.07	9.37	7.78	9.99		9.39	9.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1612##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査