

表 796 HDF希釈方法 原疾患別（オフラインHDF 透析回数週3回）

原疾患	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	202 (13.6)	1,283 (86.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,487 (100.0)		156	1,643
慢性腎孟腎炎 (%)	4 (10.3)	35 (89.7)			39 (100.0)		5	44
急速進行性糸球体腎炎 (%)	4 (14.3)	24 (85.7)			28 (100.0)		4	32
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	4 (9.8)	37 (90.2)			41 (100.0)		5	46
その他の分類不能の腎炎 (%)	2 (10.0)	18 (90.0)			20 (100.0)		3	23
多発性囊胞腎 (%)	11 (8.5)	118 (91.5)			129 (100.0)		7	136
腎硬化症 (%)	34 (14.7)	198 (85.3)			232 (100.0)		26	258
悪性高血圧 (%)	2 (9.1)	20 (90.9)			22 (100.0)		2	24
糖尿病性腎症 (%)	165 (13.6)	1,041 (86.0)	4 (0.3)	1 (0.1)	1,211 (100.0)		147	1,358
SLE腎炎 (%)	3 (7.0)	40 (93.0)			43 (100.0)		5	48
アミロイド腎 (%)	2 (20.0)	8 (80.0)			10 (100.0)		1	11
痛風腎 (%)	2 (14.3)	12 (85.7)			14 (100.0)		1	15
先天性代謝異常による腎不全 (%)	2 (50.0)	2 (50.0)			4 (100.0)			4
腎・尿路結核 (%)								
腎・尿路結石 (%)		7 (100.0)			7 (100.0)			7
腎・尿路腫瘍 (%)	1 (8.3)	11 (91.7)			12 (100.0)		3	15
閉塞性尿路障害 (%)		7 (100.0)			7 (100.0)			7
骨髓腫 (%)	1 (16.7)	5 (83.3)			6 (100.0)		2	8
腎形成不全 (%)		11 (100.0)			11 (100.0)		3	14
不明 (%)	44 (14.5)	259 (85.2)	1 (0.3)		304 (100.0)		50	354
再導入 (%)	3 (6.4)	44 (93.6)			47 (100.0)		3	50
その他 (%)	15 (17.6)	70 (82.4)			85 (100.0)		6	91
合計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
記載なし (%)								
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1613##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査