

表 797 HDF希釈方法 透析時間(分/回)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

透析時間分	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
180未満 (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
180～ (%)	58 (24.7)	176 (74.9)		1 (0.4)	235 (100.0)		42	277
210～ (%)	26 (12.6)	181 (87.4)			207 (100.0)		22	229
240～ (%)	355 (14.0)	2,171 (85.7)	6 (0.2)		2,532 (100.0)		281	2,813
270～ (%)	28 (8.3)	308 (91.7)			336 (100.0)		27	363
300～ (%)	30 (7.6)	362 (92.1)		1 (0.3)	393 (100.0)		35	428
330～ (%)	2 (9.5)	19 (90.5)			21 (100.0)		3	24
360～ (%)	2 (8.0)	23 (92.0)			25 (100.0)		3	28
390～ (%)		4 (100.0)			4 (100.0)			4
420～ (%)		4 (100.0)			4 (100.0)			4
合計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		414	4,173
記載なし (%)							15	15
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
平均	238.43	247.11	240.00	240.00	245.94		241.18	245.46
標準偏差	28.90	30.37		84.85	30.32		31.12	30.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D1614##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査