

表 806 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オフラインHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		2	4
0.4～ (%)	5 (9.6)	47 (90.4)			52 (100.0)		9	61
0.6～ (%)	34 (11.3)	268 (88.7)			302 (100.0)		38	340
0.8～ (%)	65 (11.7)	490 (88.1)	1 (0.2)		556 (100.0)		46	602
1.0～ (%)	36 (14.0)	222 (86.0)			258 (100.0)		22	280
1.2～ (%)	9 (14.1)	55 (85.9)			64 (100.0)		9	73
1.4～ (%)		9 (100.0)			9 (100.0)		1	10
1.6～ (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
1.8～ (%)								
2.0～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
合計 (%)	150 (12.0)	1,094 (87.9)	1 (0.1)		1,245 (100.0)		127	1,372
記載なし (%)	13 (13.8)	80 (85.1)		1 (1.1)	94 (100.0)		25	119
総計 (%)	163 (12.2)	1,174 (87.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,339 (100.0)		152	1,491
平均	0.92	0.89	0.93		0.90		0.86	0.89
標準偏差	0.22	0.18			0.19		0.21	0.19

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1623##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査