

表 808 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)		9			9			9
20~ (%)		(100.0)			(100.0)			
30~ (%)	34	236			270		29	299
40~ (%)	(12.6)	(87.4)			(100.0)			
40~ (%)	67	539		1	607		69	676
50~ (%)	(11.0)	(88.8)		(0.2)	(100.0)			
50~ (%)	47	262	1		310		35	345
60~ (%)	(15.2)	(84.5)	(0.3)		(100.0)			
60~ (%)	10	78			88		8	96
70~ (%)	(11.4)	(88.6)			(100.0)			
70~ (%)	1	23			24		1	25
80~ (%)		11			11		2	13
90~ (%)								
100~ (%)		1			1			1
110~ (%)								
120~ (%)								
合計 (%)	159 (12.0)	1,159 (87.8)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,320 (100.0)		144	1,464
記載なし (%)	4 (21.1)	15 (78.9)			19 (100.0)		8	27
総計 (%)	163 (12.2)	1,174 (87.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,339 (100.0)		152	1,491
平均	47.03	47.45	55.60	44.70	47.41		47.23	47.39
標準偏差	8.40	9.73			9.57		9.19	9.53

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1625##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査