

表 811 HDF希釈方法 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	2 (10.5)	17 (89.5)			19 (100.0)		3	22
7.0～ (%)	2 (13.3)	13 (86.7)			15 (100.0)		2	17
7.5～ (%)	7 (8.1)	79 (91.9)			86 (100.0)		8	94
8.0～ (%)	32 (14.8)	183 (84.7)		1 (0.5)	216 (100.0)		12	228
8.4～ (%)	11 (14.9)	63 (85.1)			74 (100.0)		10	84
8.5～ (%)	125 (15.1)	699 (84.6)	2 (0.2)		826 (100.0)		84	910
9.0～ (%)	141 (13.4)	909 (86.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,053 (100.0)		102	1,155
9.5～ (%)	82 (10.6)	695 (89.4)			777 (100.0)		70	847
10.0～ (%)	10 (9.3)	98 (90.7)			108 (100.0)		23	131
10.1～ (%)	37 (13.7)	233 (86.3)			270 (100.0)		27	297
10.5～ (%)	27 (19.3)	113 (80.7)			140 (100.0)		19	159
11.0～ (%)	7 (12.7)	48 (87.3)			55 (100.0)		5	60
11.5～ (%)		20 (100.0)			20 (100.0)		3	23
12.0～ (%)		12 (100.0)			12 (100.0)		2	14
合計 (%)	483 (13.2)	3,182 (86.7)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,671 (100.0)		370	4,041
記載なし (%)	18 (20.5)	68 (77.3)	2 (2.3)		88 (100.0)		59	147
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
平均	9.22	9.27	8.95	8.75	9.27		9.31	9.27
標準偏差	0.77	0.80	0.26	0.64	0.80		0.86	0.81

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1628##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査