

表 814 HDF希釈方法 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析前 ヘモグロビン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
5~ (%)	1 (25.0)	3 (75.0)			4 (100.0)		2	6
6~ (%)	2 (11.8)	15 (88.2)			17 (100.0)		1	18
7~ (%)	7 (10.9)	57 (89.1)			64 (100.0)		6	70
8~ (%)	24 (12.1)	175 (87.9)			199 (100.0)		22	221
9~ (%)	75 (12.7)	512 (86.9)	1 (0.2)	1 (0.2)	589 (100.0)		59	648
10~ (%)	159 (13.8)	993 (86.2)			1,152 (100.0)		113	1,265
11~ (%)	141 (13.2)	920 (86.4)	3 (0.3)	1 (0.1)	1,065 (100.0)		103	1,168
12~ (%)	53 (12.2)	380 (87.6)	1 (0.2)		434 (100.0)		42	476
13~ (%)	20 (16.1)	103 (83.1)	1 (0.8)		124 (100.0)		13	137
14~ (%)	9 (23.1)	30 (76.9)			39 (100.0)		5	44
合計 (%)	491 (13.3)	3,190 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,689 (100.0)		367	4,056
記載なし (%)	10 (14.3)	60 (85.7)			70 (100.0)		62	132
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
平均	10.86	10.77	11.82	10.45	10.78		10.74	10.78
標準偏差	1.36	1.31	1.30	1.06	1.32		1.39	1.32

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1631##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査