

表 815 HDF希釈方法 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

総コレステロール 濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	14 (10.6)	118 (89.4)			132 (100.0)		10	142
100～ (%)	53 (14.8)	304 (84.9)	1 (0.3)		358 (100.0)		41	399
120～ (%)	85 (14.3)	510 (85.6)	1 (0.2)		596 (100.0)		53	649
140～ (%)	101 (15.4)	552 (84.4)	1 (0.2)		654 (100.0)		66	720
160～ (%)	80 (14.1)	484 (85.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	566 (100.0)		56	622
180～ (%)	47 (12.8)	320 (87.0)	1 (0.3)		368 (100.0)		26	394
200～ (%)	29 (14.5)	170 (85.0)	1 (0.5)		200 (100.0)		22	222
220～ (%)	11 (13.6)	69 (85.2)		1 (1.2)	81 (100.0)		10	91
240～ (%)	2 (6.1)	31 (93.9)			33 (100.0)		5	38
260～ (%)	3 (13.6)	19 (86.4)			22 (100.0)		6	28
合計 (%)	425 (14.1)	2,577 (85.6)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,010 (100.0)		295	3,305
記載なし (%)	76 (10.1)	673 (89.9)			749 (100.0)		134	883
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
平均	154.70	154.99	161.50	200.00	155.00		157.37	155.21
標準偏差	35.69	36.36	40.18	38.18	36.28		40.28	36.65

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1632##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査