

表 818 HDF希釈方法 透析歴(年)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析歴	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	6,822	258		34	7,114		327	7,441
(%)	(95.9)	(3.6)		(0.5)	(100.0)			
2年～	11,307	443		37	11,787		692	12,479
(%)	(95.9)	(3.8)		(0.3)	(100.0)			
5年～	12,591	582	1	54	13,228		711	13,939
(%)	(95.2)	(4.4)	(0.0)	(0.4)	(100.0)			
10年～	7,271	316		24	7,611	1	461	8,073
(%)	(95.5)	(4.2)		(0.3)	(100.0)			
15年～	4,356	258		6	4,620		289	4,909
(%)	(94.3)	(5.6)		(0.1)	(100.0)			
20年～	2,777	164		10	2,951		188	3,139
(%)	(94.1)	(5.6)		(0.3)	(100.0)			
25年～	1,655	92		3	1,750		146	1,896
(%)	(94.6)	(5.3)		(0.2)	(100.0)			
30年～	937	69		4	1,010		84	1,094
(%)	(92.8)	(6.8)		(0.4)	(100.0)			
35年～	536	31			567		53	620
(%)	(94.5)	(5.5)			(100.0)			
40年～	192	13			205		21	226
(%)	(93.7)	(6.3)			(100.0)			
合計	48,444	2,226	1	172	50,843	1	2,972	53,816
(%)	(95.3)	(4.4)	(0.0)	(0.3)	(100.0)			
不明	13	1			14		2	16
(%)	(92.9)	(7.1)			(100.0)			
記載なし								
(%)								
総計	48,457	2,227	1	172	50,857	1	2,974	53,832
(%)	(95.3)	(4.4)	(0.0)	(0.3)	(100.0)			
平均	9.18	10.51	5.00	7.48	9.23	11.00	10.35	9.29
標準偏差	8.41	9.07		7.35	8.44		9.27	8.49

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1712##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査