

表 820 HDF希釈方法 透析時間(分/回)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析時間分	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
180未満 (%)	55 (90.2)	6 (9.8)			61 (100.0)		3	64
180～ (%)	2,650 (94.7)	124 (4.4)		24 (0.9)	2,798 (100.0)		145	2,943
210～ (%)	3,195 (93.9)	183 (5.4)		23 (0.7)	3,401 (100.0)		185	3,586
240～ (%)	33,198 (95.3)	1,514 (4.3)	1 (0.0)	117 (0.3)	34,830 (100.0)	1	2,030	36,861
270～ (%)	4,289 (96.0)	175 (3.9)		2 (0.0)	4,466 (100.0)		236	4,702
300～ (%)	4,408 (95.5)	201 (4.4)		5 (0.1)	4,614 (100.0)		281	4,895
330～ (%)	216 (93.9)	13 (5.7)		1 (0.4)	230 (100.0)		7	237
360～ (%)	324 (97.0)	10 (3.0)			334 (100.0)		23	357
390～ (%)	10 (100.0)				10 (100.0)		1	11
420～ (%)	37 (97.4)	1 (2.6)			38 (100.0)		2	40
合計 (%)	48,382 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,782 (100.0)	1	2,913	53,696
記載なし (%)	75 (100.0)				75 (100.0)		61	136
総計 (%)	48,457 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,857 (100.0)	1	2,974	53,832
平均	245.21	243.78	240.00	230.82	245.10	240.00	246.73	245.19
標準偏差	28.96	29.23		26.54	28.97		28.69	28.96

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1714##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査