

表 824 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前 クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	2 (100.0)				2 (100.0)			2
2~ (%)	76 (97.4)	1 (1.3)		1 (1.3)	78 (100.0)		5	83
4~ (%)	435 (96.5)	15 (3.3)		1 (0.2)	451 (100.0)		28	479
6~ (%)	2,036 (95.5)	95 (4.5)		2 (0.1)	2,133 (100.0)		114	2,247
8~ (%)	5,187 (95.4)	240 (4.4)		12 (0.2)	5,439 (100.0)		311	5,750
10~ (%)	7,565 (95.2)	359 (4.5)	1 (0.0)	18 (0.2)	7,943 (100.0)		426	8,369
12~ (%)	6,525 (95.2)	318 (4.6)		12 (0.2)	6,855 (100.0)		386	7,241
14~ (%)	3,202 (94.9)	166 (4.9)		5 (0.1)	3,373 (100.0)		209	3,582
16~ (%)	1,224 (94.8)	66 (5.1)		1 (0.1)	1,291 (100.0)		89	1,380
合計 (%)	26,252 (95.2)	1,260 (4.6)	1 (0.0)	52 (0.2)	27,565 (100.0)		1,568	29,133
記載なし (%)	594 (96.4)	6 (1.0)		16 (2.6)	616 (100.0)		70	686
総計 (%)	26,846 (95.3)	1,266 (4.5)	1 (0.0)	68 (0.2)	28,181 (100.0)		1,638	29,819
平均	11.41	11.58	10.40	11.00	11.42		11.51	11.42
標準偏差	2.71	2.83		2.45	2.72		2.75	2.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1718##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査