

表 825 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前 クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	5 (100.0)				5 (100.0)			5
2~ (%)	104 (94.5)	5 (4.5)		1 (0.9)	110 (100.0)		6	116
4~ (%)	598 (95.7)	24 (3.8)		3 (0.5)	625 (100.0)		41	666
6~ (%)	2,498 (94.8)	123 (4.7)		15 (0.6)	2,636 (100.0)	1	141	2,778
8~ (%)	4,997 (94.7)	265 (5.0)		15 (0.3)	5,277 (100.0)		350	5,627
10~ (%)	4,421 (95.3)	205 (4.4)		11 (0.2)	4,637 (100.0)		290	4,927
12~ (%)	1,532 (95.2)	67 (4.2)		10 (0.6)	1,609 (100.0)		107	1,716
14~ (%)	241 (96.8)	8 (3.2)			249 (100.0)		19	268
16~ (%)	30 (96.8)	1 (3.2)			31 (100.0)		2	33
合計 (%)	14,426 (95.0)	698 (4.6)		55 (0.4)	15,179 (100.0)	1	956	16,136
記載なし (%)	350 (94.9)	4 (1.1)		15 (4.1)	369 (100.0)		51	420
総計 (%)	14,776 (95.0)	702 (4.5)		70 (0.5)	15,548 (100.0)	1	1,007	16,556
平均	9.55	9.46		9.26	9.54	7.10	9.60	9.54
標準偏差	2.16	2.04		2.38	2.15		2.15	2.15

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1719##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査